



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/400 - Ejercicio y patologías crónicas en pacientes mayores

F. Antón García^a, E. Correcher Salvador^b, C. Mir Sánchez^c, C. Pérez Ollero^d, L. Bort Llorca^d y G. Oliver Guimerá^e

^aMédico de Familia. Centro de Salud Fuensanta. Valencia. ^bMédico de Familia. Centro de Salud de Picassent. Valencia. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Barrio de la Luz. Valencia. ^dMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuensanta. Valencia. ^eMédico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuensanta. Valencia.

Resumen

Objetivos: Determinar la prevalencia de las patologías crónicas registradas y su control clínico en pacientes mayores de 65 años según que realicen o no ejercicio de forma habitual.

Metodología: Evaluar los diagnósticos, situación clínica y realización de ejercicio (al menos 3 horas semanales de forma sistemática) de los pacientes mayores de 65 años que acuden a la consulta de Medicina Familiar de nuestro centro de salud por cualquier motivo. Variables: edad, patologías crónicas (diabetes (DM), hipertensión arterial (HTA), artrosis, dislipemia (DL), EPOC), tensión arterial sistólica (TAS), diastólica (TAD), colesterol total (COL), LDL-colesterol (LDL), índice masa corporal (IMC), HbA1c (en pacientes diabéticos), Consultas totales en el Centro Salud (CS) (CCS) y en todos los niveles asistenciales (CTNA) durante el último año.

Resultados: Se han evaluado 252 personas mayores de 65 años. Refieren realizar ejercicio físico habitual 186 (73,8%). Ejercicio/No ejercicio: edad 72,02/72,33 años ($p = NS$), DM 24,7%/40,9% ($p = 0,013$), HTA 71%/79,4% ($p = NS$), artrosis 61,2%/91,2% ($p = 0,001$), DL 69,4%/79,4% ($p = NS$), EPOC 6,8%/12,5% ($p = NS$), TAS 132,78/135,02 mmHg ($p = NS$), TAD 73,03/74,33 mmHg ($p = NS$), IMC 28,77/29,85 ($p = NS$), COL 203,1/195,6 mg/dl ($p = NS$), LDL 122,8/114,2 mg/dl ($p = NS$), HbA1c 6,4/6,47 ($p = NS$), CCS 13,62/13,74 ($p = NS$), CTNA 19,17/20,21 ($p = NS$).

Conclusiones: 1. Un alto porcentaje de personas mayores afirman realizar ejercicio habitual. 2. La prevalencia de las patologías crónicas es mayor en los pacientes sedentarios. 3. No hay diferencias en el grado de control de las patologías crónicas. 4. No hay diferencias en la utilización de los recursos sanitarios.