



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/1448 - Epidemiología de las Lesiones de Piel y Partes blandas en Atención Primaria de la Salud, Asunción-Paraguay, año 2014

A. Macedo Cantero^a y D. Ávalos^b, Domingo

^aMédico de Familia. Unidad de Salud Familiar Republicano. Barrio Republicano. Asunción, Paraguay. ^bJefe de Departamento de Investigación. Dirección General de Atención Primaria de la Salud. Asunción, Paraguay.

Resumen

Objetivos: La frecuencia de lesiones de piel y partes blandas (LPPB) en pobladores del área de influencia de la Unidad de Salud de la Familia (USF) Republicano ESII, Asunción-Paraguay en el año 2014.

Metodología: Estudio observacional descriptivo. Fueron incluidos todos pobladores de ambos sexos del área de influencia de la USF Republicano en el año 2014. Se recurrieron a los registros de Subsistema de Atención Ambulatoria del MSPyBS para recopilar datos demográficos y las causas de consultas.

Resultados: Fueron registrados un total 209 casos con LPPB, promedio mensual de 17,4 consultas; entre los meses de abril y julio el promedio fue de 22 consultas. El 6,3% fueron derivados al especialista. La Razón H:M fue de 1:1, Mediana de edad 11 años (Mín = 0 y Máx = 80), el 57,9% correspondieron al grupo de 15 años. Las lesiones más frecuentes fueron: absceso cutáneo, furúnculo con 23,4%, micosis 16,3%, piodermitis 15,3%, dermatitis y eczema 9,9%, pediculosis/acariasis 6,7%, estrongiloidiasis cutánea 6,3%, otras 10%. En grupo de mujeres las principales afecciones fueron la micosis con 20,6%, piodermitis 18,6% y absceso cutáneo/furúnculo 17,6%; en hombres el absceso/furúnculo con el 29,0%, celulitis 13,1% y micosis y piodermitis con 12,1 respectivamente.

Conclusiones: las lesiones de piel y partes blandas ocupan un lugar importante entre las consultas en atención primaria, con etiologías que varían según sexo y edad. Un alto porcentaje fueron resueltos en la USF.