Semergen. 2015;41 (Espec Congr):75

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

160/1862 - CARACTERÍSTICAS de los pacientes hipertensos mayores de 80 años en RELACIÓN a los estadios de enfermedad renal CRÓNICA (estudio prescap 2012)

F.M. Navarro Ros[a], J. Precioso Costa[b], M.J. Larré Muñoz[c], A. Tamarit Latre[d], A. Núñez Villén[e], J. Alonso Moreno[f], M.A. Prieto García[g], R. Micó Pérez[h], J.L. Llisterri Caro[a] y J.L. Gorriz Teruel[i]

[a]Médico de Familia. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. [b]Médico de Familia. Centro de Salud Alfafar. Valencia. [c]Médico de Familia. Área de Urgencias. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. [d]Médico Residente de 3er año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Zona Hospital Peset. Valencia. [e]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. [f]Médico de Familia. Centro de Salud Silleria. Toledo. [g]Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín. Oviedo. [h]Médico de Familia. Centro de Salud Juan Llorens. Valencia. [i]Nefrólogo. Hospital Dr. Peset. Valencia.

Resumen

Objetivos: Analizar las características de los pacientes hipertensos ≥ 80 años del estudio PRESCAP en relación a los grados de enfermedad renal crónica (ERC).

Metodología: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó hipertensos de 80 o más años, reclutados consecutivamente por médicos de familia de toda España. Se consideró presencia de ERC cuando la tasa de filtrado glomerular (TFG) según CKD-EPI era 60 mL/min/1,73 m^2. Se clasificó en Estadios 1-2 (TFG > 60), estadio 3a (TFG 45-60), estadio 3b (TFG 30-45) y estadios 4-5 (TFG 30). Se analizó las características clínicas de interés, el control de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y los tratamientos antihipertensivos según estadio de ERC.

Resultados: Se incluyó a 1.306 pacientes, 817 mujeres (62,6%) y 489 varones (37,4%), 661 pacientes estaban en estadio 1-2, 386 en estadio 3a, 206 en estadio 3b y 53 en estadios 4-5. El porcentaje de pacientes con buen control de PAS y PAD por estadios fue del 76,9%, 78,8%, 78,2 y 84,9% respectivamente. Los pacientes en estadio más avanzado de ERC (3b y 4-5) eran de mayor edad, presentaban mayores niveles de

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

colesterol LDL, glucosa y TGC, más prevalencia de enfermedad cardiovascular e hipertrofia ventricular izquierda y tratados con más antihipertensivos. Los diuréticos se utilizaban en el 35,8% de pacientes en estadio 4-5.

Conclusiones: La TFG los pacientes presentan peor control de FRCV, mayor grado de ECV y mayor requerimiento de fármacos antihipertensivos. Llama la atención la escasa utilización de diuréticos en los estadios 4-5 ERC.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.