



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/1704 - Un caso de infarto

S. García Moreno<sup>a</sup> y L.B. González-Haba Moro<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), Sevilla. <sup>b</sup>Enfermera. Sevilla.

### Resumen

**Descripción del caso:** Paciente de 54 años, HTA y dislipémico, fumador, sin otros antecedentes, presenta dolor precordial opresivo no irradiado, sudoración y náuseas de comienzo súbito, de tres horas justas de evolución. En electrocardiograma se constata ritmo sinusal a 74 latidos por minuto, con segmento ST ascendido en II, III, aVF y tendencia en derivaciones V4 a V6, con imagen espejada en V1 a V3, motivo por el cual nos activan (061). Administramos Aspirina y clopidogrel, heparina, nitroglicerina en perfusión, analgesia (cloruro mórfito) y fibrinólisis in situ, sin traducción electrocardiográfica sugerente de reperfusión, con leve mejoría clínica del dolor. Iniciamos traslado a hospital de referencia (a dos horas de camino) y el paciente presenta a mitad de camino ensanchamiento rápido de los complejos QRS, sufriendo parada cardiorrespiratoria: ritmo inicial de fibrilación ventricular. Realizamos tratamiento eléctrico y protocolo habitual de soporte vital avanzado, llegando a requerir el paciente hasta cuatro desfibrilaciones, 1 mg de adrenalina y 300 mg de amiodarona (tras tercera descarga) y 1 mg de adrenalina tras cuarta (al constatar FV de grano fino, equivalente a asistolia tras la misma), intubación orotraqueal y VMI al comienzo de la PCR. Evolución rápida hacia el exitus, con instauración rápida de cianosis de cara y cuello. Se pone el caso en conocimiento de coordinación, juez de guardia de localidad de origen y médico forense y se activa protocolo judicial.

**Exploración y pruebas complementarias:** Mal estado general, palidez y sudoración profusa, quejoso de dolor y eupneico. A la auscultación, tonos rítmicos, sin soplos ni extratonos, sin otros ruidos patológicos. Resto de la exploración normal. Frecuencia cardiaca a 75 latidos por minuto, con TAS de 120 mmHg y TAD de 80 mmHg. Saturación arterial de oxígeno a 96%. Glucemia capilar de 110 mg/dL.

**Juicio clínico:** Síndrome coronario agudo con elevación de ST en cara inferoposterior.

**Diagnóstico diferencial:** Otras causas de dolor torácico.

**Comentario final:** La reperfusión precoz es clave en el manejo de estos pacientes. Según la evidencia científica, la intervención coronaria percutánea primaria es superior a la fibrinolisis y es el tratamiento de elección siempre que el retraso a la intervención coronaria no supere los 90-120 min. (en caso contrario se recomienda iniciar el tratamiento con fibrinolisis). Las recomendaciones más actuales inciden en la importancia del diagnóstico prehospitalario y la organización eficiente entre ambulancias y hospitales para reducir los retrasos. La atención a la familia cobra gran relevancia en el ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias (más en situaciones de duelo o fallecimiento o patologías potencialmente mortales).

## BIBLIOGRAFÍA

1. Fernández-Ortiza A, et al Evidencias de la revascularización en el infarto agudo de miocardio. Rev Esp Cardiol. 2011; Supl.11(C):9-14.
2. Pacheco Rodríguez A, et al. Fibrinólisis prehospitalaria en el enfermo con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Historia y recomendaciones. Emergencias. 2009;21:441-50.
3. Tubaro M, et al. Tratamiento prehospitalario de los pacientes con IAMCEST. Una declaración científica del Working Group Acute Cardiac Care de la European of Cardiology. Rev Esp Cardiol. 2012;65(1):60-70.
4. Rosell-Ortiz F, et al. Tratamiento extrahospitalario y supervivencia al año de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Resultados del Proyecto para la Evaluación de la Fibrinólisis Extrahospitalaria (PEFEX). Rev Esp Cardiol. 2008;61(1):14-21.