Semergen. 2016;42(Espec Congr 15):13

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

212/2236 - Estudio descriptivo de pacientes con cobertura vacunal antineumocócica conjugada 13-valente

C. Terrero Castillo[a], J. Novo de Matos[a], Á. Ureña Aguillera[a], B. de Victoria Fernández[a], C. Álvarez Hernández Cañizares[b], A. Pozo Teruel[b], M.R. Martín Cano[b], V. Abadía Ruber[b], M.C. Escudero Lafont[b] y V. Villegas Rodríguez[b]

[a]Médico Residente; [b]Médico de Familia. Centro de Salud Canillejas. Madrid.

Resumen

Objetivos: Actualmente en España, la enfermedad neumocócica invasiva sigue siendo una causa importante de morbimortalidad y dado que la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente (Prevenar®) ha demostrado su eficacia, nos planteamos realizar este estudio con el objetivo de conocer la cobertura vacunal en pacientes con patologías médicas de riesgo, en las que actualmente está indicada dicha vacunación y que en este momento está financiada por la Comunidad de Madrid. Se evaluó si la indicación de vacunación fue desde Atención Primaria.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen pacientes mayores de 18 años con indicación de vacunación antineumocócica desde el año 2013 a 2016 en nuestro Centro. Dada la dificultad de obtener una muestra, por no disponer de datos poblacionales, se decidió realizar un estudio piloto. Del total de 1.503 pacientes registrados con patologías de riesgo e indicación de vacunación financiada, seleccionamos una muestra piloto de 146 pacientes, utilizando muestreo aleatorio sistemático y analizamos la edad, sexo, vacunación e indicación desde Atención Primaria.

Resultados: Se incluyeron 146 pacientes con indicación de vacunación y de éstos 99 hombres y 47 mujeres con una edad media de 61,78 años. Se detectó un 87% de pacientes no vacunados y sólo un 13% vacunados de nuestra muestra cuyo sexo predominante fueron varones (53%). La enfermedad renal crónica (16,3%) y las

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

hepatopatías crónicas avanzadas (14,4%) fueron las patologías médicas más frecuentes y con mayor porcentaje de vacunación (3,4% y 2,7% respectivamente). El alcoholismo crónico fue la patología más recomendada para la vacunación desde Atención Primaria (8,9%) aunque con resultados de 0% de vacunación seguido de la enfermedad de Hodgkin con un 4,8% de recomendación y 1,4% de vacunación.

Conclusiones: La cobertura vacunal antineumocócica Prevenar® es baja en nuestro centro de salud. Sería necesario insistir en las recomendaciones desde Atención Primaria para la vacunación correcta en grupos de riesgo. La enfermedad renal crónica es la patología con más pacientes vacunados. Los pacientes con alcoholismo crónico y síndrome nefrótico no estaban vacunados, a pesar de estar recomendado.

Palabras clave: *Vacuna antineumocócica 13-valente.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.