



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/428 - La vacunación de la gripe en embarazadas de una zona rural

N. Ramos Rodríguez<sup>a</sup>, L. López-Marín<sup>b</sup>, C.M. Martínez-Cara<sup>c</sup>, J.M. Madeira Martins<sup>d</sup>, A. Cabello Chanfreut<sup>e</sup>, R.J. Reyes Vallejo<sup>f</sup>, A. López Matarín<sup>f</sup>, J. López Moreno<sup>g</sup>, J. Cuevas Cruces<sup>h</sup> y F. Leiva-Cepas<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Palma del Río. Córdoba. <sup>b</sup>Enfermera. Universidad Católica de Valencia. Valencia. <sup>c</sup>Enfermera. Centro de Salud Roquetas Sur. Roquetas de Mar. Almería. <sup>d</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Fuensanta. Córdoba. <sup>e</sup>Médico de Familia; <sup>f</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica de Occidente. Consultorio de Villarrubia. Córdoba. <sup>g</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Aeropuerto. Córdoba.

### Resumen

**Objetivos:** Comprobar si las gestantes se vacunan durante la gestación y conocer su motivación para ello. Identificar si las gestantes saben los beneficios e importancia de la vacuna antígrupal (VAG) en la gestación. Valorar en qué medida los médicos de familia la conocen y aconsejan a las embarazadas dicha vacunación.

**Metodología:** Diseño: estudio observacional descriptivo. Emplazamiento: Consultorio rural. Población: mujeres gestantes mayores de 18 años que se encuentren embarazadas ( $N = 62$ ) y médicos de familia que lleven el mismo ( $N = 8$ , 4 FEA de Medicina Familiar y Comunitaria y 4 Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria), durante el año 2015. Análisis descriptivo para variables cuantitativas y cualitativas (variables sociodemográficas, encuesta a médicos y embarazadas sobre beneficio de la VAG en embarazadas y consejo de la misma).

**Resultados:**  $N = 17$ . Edad media embarazadas 27,88 años ( $DT \pm 4,25$ ). Semana de gestación media de 21,10 ( $DT \pm 11,20$ ). El 33% tenían estudios universitarios. El primer embarazo en el 59% de las mujeres. El 93% no se ha vacunado nunca previamente sin estar embarazada, en otros embarazos el 5%. El 75% desconocen los beneficios de la VAG, el 60% no la solicitan (el 40% por desconocer sus beneficios y el 20% por no creer que sea necesaria). El 12% se vacunan. Edad media de los médicos 50,5 años ( $DT \pm 13,24$ ), 50% mujeres; respecto a los residentes: 29,5 años ( $DT \pm 8,5$ ) 25% mujeres. Media de años en el proceso de embarazo 3,17 ( $DT \pm 2,53$ ). El 89,9% conocen los beneficios de la VAG. La aconsejan el 73,57%, no creer que es necesario es la segunda causa de no prescripción, y el olvido en tercer lugar.

**Conclusiones:** La mayoría de las embarazadas no se vacunan, especialmente por el desconocimiento de los beneficios de su uso. A mayor nivel de educación, mejor es la adherencia. Respecto a los profesionales residentes y FEA conocen los beneficios; siendo el consejo de VAG mayor en médicos adjuntos.

**Palabras clave:** Vacuna antígrupal. Embarazo. Gripe.