Semergen. 2016;42(Espec Congr 15):14

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

212/858 - HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE HEPÁTICO

A. López Matarín[a], F. Leiva-Cepas[b], J.M. Madeira Martins[c], A. Rizo Barrios[d], F. Castaño Membrives[e], M. Gutiérrez Soto[a] y M.D. Maestre Serrano[e]

[a]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; [e]Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Guadalquivir. Córdoba. [b]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica de Occidente. Consultorio de Villarrubia. Córdoba. [c]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Fuensanta. Córdoba. [d]Médico Residente de Anatomía Patológica. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 43 años que acude a Urgencias por dolor en hipocondrio derecho de 3 semanas de evolución, modificable con la respiración y los movimientos junto con sensación nauseosa sin otra clínica acompañante. Antecedentes personales: Anemia ferropénica de origen ginecológico.

Exploración y pruebas complementarias: Aceptable estado general. Abdomen doloroso a la palpación en epigastrio, mesogastrio e hipocondrio derecho, sin otros hallazgos. Se solicita analítica, objetivándose anemia conocida y ecografía abdominal hallando dos lesiones focales hipoecogénicas bien definidas en lóbulo hepático izquierdo de 5,3 × 4 cm y de 3,1 × 2,4 cm, y otra lesión de 13 cm, heterogénea y de predominio hipoecogénica, en lóbulo hepático derecho. Ante los hallazgos se deriva a Medicina Interna, donde se realiza RMN, BAG y estudio histopatológico, con diagnóstico final de hemangioendotelioma epitelioide.

Juicio clínico: Hemangioendotelioma epitelioide hepático.

Diagnóstico diferencial: Hemangioma hepático, hemangiosarcoma hepático, metástasis hepáticas.

Comentario final: Se trata de una entidad infrecuente, de curso clínico y pronóstico impredecibles, con un potencial letal difícil de prever. Su diagnóstico es esencialmente a través de histopatología, y ha de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las lesiones focales hepáticas, pese a su escasa incidencia, dado su especial manejo.

Bibliografía

1. Choi KMoon W. Epithelioid hemangioendothelioma of the liver. Clinical and Molecular Hepatology. 2013;19:315.
2. Pareja E, Cortés M, Rayón M, Moya Á, Mir J. Hemangioendotelioma epitelioide: un tumor hepático infrecuente. Gastroenterología y Hepatología. 2010;33:445-8.
3. Kenny A, Spina J, García Mónaco R. Hemangioendotelioma epitelioide hepático: un desafío diagnóstico para el médico radiólogo. Revista Argentina de Radiología. 2014;78:35-41.

Palabras clave: *Hemangioendotelioma. Lesión focal. Hígado.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.