



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/3272 - ¿Cómo Influye la presencia de dolor irruptivo en la salud de los pacientes oncológicos que acuden a la consulta de atención primaria? Estudio EDIMFA

M. González Béjar^a, M.O. García Vallejo^b, R. Piedra Castro^c, C. Rodríguez Gallego^d y L. Cabañas Enríquez^e

^aMédico de Familia. Centro de Salud Montesa. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN. Miembro del GRAP. Madrid. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Comillas. Madrid. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara. ^dMédico de Familia. Centro de Salud. Aravaca. Madrid. ^eMédico de Familia. Ejercicio Privado. Madrid.

Resumen

Objetivos: Conocer la salud y calidad de vida de los pacientes con dolor oncológico atendidos en atención primaria.

Metodología: Para ello se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables recogidas del cuestionario SF-12 realizado a los 1.586 participantes. Las variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias absolutas y porcentajes. Las variables cuantitativas se analizaron mediante la media, desviación estándar, mediana y rango intercuartílico. El estudio analítico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS v.21.0.

Resultados: De los 1.586 encuestados, el 0,25% (4) considera que su salud es excelente, el 0,88% (14) piensa que es muy buena, el 12,55% (199) la considera buena, el 46,41% (736) la considera regular y el 38,40% de los pacientes (609) indicó que era mala. El 1,51% de los pacientes (24) no contestó a esta pregunta. Preguntados sobre las limitaciones en su actividad cotidiana a causa de su salud física durante las últimas 4 semanas, el 15,70% de los pacientes (249) indicó que no había tenido que hacer menos de lo que hubiera querido hacer y el 83,61% (1.326) indicó que sí. El 0,69% de los pacientes (11) no contestó a esta pregunta. Asimismo, el 16,46% de los encuestados (261) indicó que no había tenido que dejar de hacer ninguna tarea en su trabajo o en sus actividades cotidianas y el 82,60% (1.310) indicó que sí. El 0,95% de los pacientes (15) no contestó a esta pregunta.

Conclusiones: En general los pacientes con dolor oncológico consideran que su salud es regular y en un 38,40% mala, limitando su actividad cotidiana que en la mayoría (82%) obligaba a dejar de hacer alguna tarea en su trabajo o en sus actividades cotidianas. Estas crisis, tienen una repercusión importante en estos pacientes.

Palabras clave: Crisis. Dolor irruptivo. Salud.