



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/661 - Experiencia con oxicodona/naloxona en paciente con dolor crónico en atención primaria

F. Mata Canela<sup>a</sup>, S. Cinza Sanjurjo<sup>b</sup>, R.M. Martín González<sup>c</sup>, R. Castillo Rubio<sup>d</sup>, J.L. Martínez Lázaro<sup>e</sup> y M. Bellod Sempere<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Hospital Campo Grande. Valladolid. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Porto do Son. Santiago de Compostela. <sup>c</sup>Médico de Familia. Consulta Privada Dra. Martín. Valencia. <sup>d</sup>Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. <sup>e</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Avenida de Sax. Elda. <sup>f</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Petrel I. Elda.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluar la evolución del dolor, calidad de vida (CdV) y satisfacción de pacientes con dolor crónico moderado-intenso, atendidos en Atención Primaria, tras 3 meses en tratamiento con oxicodona/naloxona (OXN).

**Metodología:** Subanálisis de estudio observacional multicéntrico de 3 meses de seguimiento. Se analizaron 77 pacientes con dolor crónico moderado intenso (EVA0-10 ? 4) en su primera consulta en Atención Primaria y tratados de forma mantenida con OXN. Se evalúa la evolución del dolor, la CdV y la satisfacción con el alivio del dolor. Cuestionarios: breve de dolor (BPI); EuroQoL-5D (CdV); satisfacción (NRS0-10 y cumplimiento de expectativas con el alivio del dolor).

**Resultados:** Mujeres 57,1%, edad media  $64 \pm 12,9$  años. Dolor osteoarticular 97,1%, 3,9% paciente oncológico, con componente neuropático el 39,0%. Mejoría sustancial en alivio de dolor medio (ENV0-10) de los pacientes tratados con OXN: 6,0 basal vs 2,9 Mes 3 ( $p < 0,001$ ), con un alivio del dolor medio del 51,6%. El 72,7% de los pacientes obtuvieron un alivio del dolor  $\geq 30\%$  y el 61,0% un alivio del dolor  $\geq 50\%$ . Mejora media en la CdV de  $0,4 \pm 0,2$  puntos (tarifa de estados de salud) en basal a  $0,7 \pm 0,2$  puntos en Mes 3 ( $p < 0,001$ ). El 87% de los pacientes estaban satisfechos con el control de su dolor y el 96% con el servicio en el que le atienden.

**Conclusiones:** Los pacientes con dolor crónico moderado-intenso en tratamiento mantenido con oxicodona/naloxona en los servicios de Atención Primaria, obtienen mejoría clínica significativa en el control de su dolor y en su CdV.

**Palabras clave:** Oxicodona/naloxona. Dolor crónico. Calidad de vida.