



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/1912 - Características sociodemográficas y satisfacción con el tratamiento de los pacientes atendidos en Atención Primaria diagnosticados de fibrilación auricular no valvular (FANV) con riesgo de ictus o embolia sistémica, en tratamiento con ACOD. Estudio BRONCE

M. de la Figuera von Wichmann^a, S. Cinza Sanjurjo^b, M.I. Egocheaga Cabello^c, M.Á. Prieto Díaz^d, J.A. División Garrote^e y N. Marín Montañés^f

^aMédico de Familia. Equipo de Atención Primaria Sardenya. Barcelona. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Porto do Son. Santiago de Compostela. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Casas Ibáñez. Albacete. ^fMedical Manager. Bayer Hispania. S.L. Sant Joan Despí.

Resumen

Objetivos: Describir las características clínicas de los pacientes con FANV y riesgo de ictus o embolia sistémica en tratamiento con anticoagulante oral directo (ACOD) desde hace al menos 3 meses y en seguimiento por parte de su médico de AP, así como determinar la satisfacción de los pacientes con dicho tratamiento.

Metodología: Estudio observacional, transversal y multicéntrico llevado a cabo en las CCAA de Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Canarias, La Rioja y Cantabria, donde AP no podía prescribir un ACOD y debía derivar al paciente al especialista (cuando se aprobó el protocolo). Se incluyeron 247 pacientes ? 18 años con FANV con riesgo de ictus o embolia sistémica atendidos en AP en los que el médico especialista hubiera modificado su pauta terapéutica a ACOD y que en el momento de la visita llevaran como mínimo 3 meses en tratamiento.

Resultados: Se analizaron datos de 246 pacientes (se excluyó 1 paciente por incumplir algún criterio de selección). Los pacientes tenían una media de $5,3 \pm 5,1$ años desde el diagnóstico de la FANV, observándose un 42,3% de los pacientes con FANV permanente, 34,6% paroxística y 23,2% persistente. Sólo en el 33,7% de los casos el médico de AP fue quien identificó la necesidad de cambio de tratamiento, siendo el cardiólogo quien en el 86,6% de los casos prescribía dicho cambio. El 77,2% de los pacientes eran polimedicados (? 5 principios activos) y el 99,2% cumplidores con su tratamiento (test de Haynes-Sackett). Se preguntó al paciente acerca de su satisfacción con el tratamiento anticoagulante a través del cuestionario ACTS (Anti-Clot Treatment Scale), observándose una puntuación media en el dominio de Carga de $54,2 \pm 6,3$ (rango 12-60) y $12,1 \pm 2,3$ en el dominio de Beneficio (rango 3-15), siendo las puntuaciones altas indicativas de una mayor satisfacción con el tratamiento.

Conclusiones: Los pacientes atendidos en AP en los que el cambio de tratamiento anticoagulante a un ACOD viene mayormente indicado por el cardiólogo, presentan un elevado cumplimiento terapéutico así como también una alta satisfacción con el tratamiento anticoagulante.

Palabras clave: FANV (*fibrilación auricular no valvular*). Atención Primaria. ACOD (*anticoagulantes orales directos*). ACTS (*Anti-Clot Treatment Scale*).