



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/1573 - Etiología infrecuente en una rinorrea común

L. Ruiz del Moral<sup>a</sup>, M. Pérez Castro<sup>b</sup>, M.I. Luna Moreno<sup>a</sup>, J. Mancera Romero<sup>c</sup> y M.R. Sánchez Pérez<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. <sup>b</sup>Médico de Familia. Málaga.

### Resumen

**Descripción del caso:** Mujer, 56 años, con AP de HTA, SAHOS en tratamiento con CPAP, IMC de 30 kg/m<sup>2</sup>. Consulta por rinorrea clara, acuosa y secreción nasal posterior con tos y disfonía de una semana de evolución, se trata de forma sintomática sin mejoría. Acude a consulta en múltiples ocasiones. Se deriva a ORL, realizan radiografía de senos paranasales indicando signos de sinusitis, pautan antibioterapia y dan alta. Persisten síntomas, se deriva a Neumología: pruebas funcionales normales y radiografía de senos normal y la derivan a Alergología con estudio negativo. Realiza múltiples consultas, se deriva nuevamente a ORL: se analiza muestra de la secreción, dando positiva para ?? transferrina. Tomografía computarizada (TC): fístula esfenoidal con salida de líquido cefalorraquídeo (LCR).

**Exploración y pruebas complementarias:** Exploración anodina salvo rinorrea acuosa derecha. Radiografía senos paranasales primera con signos de sinusitis, segunda normal. Análisis: positivo para para ?? transferrina, compatible con rinoliquorrea. TC: fístula esfenoidal con salida de LCR.

**Juicio clínico:** Fístula esfenoidal espontánea con salida de LCR.

**Diagnóstico diferencial:** Las causas de rinorrea pueden ser múltiples: infecciosas, vasomotoras, alérgicas, tumores, enfermedades inmunes y vasculitis, rinorrea cerebrovascular, fármacos, cuerpos extraños, pólipos nasales, etc. La rinorrea cerebrovascular consiste en la expulsión de LCR desde la cavidad craneal a través de las fosas nasales, traduciendo una solución de continuidad entre los espacios subaracnoides y las cavidades sinusales u otológicas que es por definición lo que llamamos fístula de LCR (FLCR).

**Comentario final:** La rinorrea por una FLCR espontánea es poco común y supone un reto diagnóstico. La pérdida de LCR es una complicación rara en antecedentes de trauma o cirugía de la base del cráneo y muy rara y peligrosa en pacientes con ventilación mecánica no invasiva sobre todo con CPAP. Uno de sus signos es la rinorrea clara y abundante, que debe hacernos sospechar sobre su posible existencia.

### Bibliografía

1. Ozdogan S, Emrah Gergin Y, Gergin Sinem, Tatarli N, Hicdonmez T. Spontaneous Rhinorrhea mimicking sinusitis. Pan African Medical Journal. 2015;20:97.
2. Yared J, Annan JE. Cerebrospinal fluid leak associated with nasal continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea. BMJ Case Reports. 2010; doi10.1136/bcr.01.2010.2659.

**Palabras clave:** Rinorrea. Fístula líquido cefalorraquídeo. Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).