



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/2756 - Reporte de caso clínico. Hemicránea paroxística

*M.A. Ordóñez Sánchez, C. Raliegos Tajahuerce, R.C. Chávez Flores, R. del Pozo Pisabarro y M. García Fernández*

*Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Eras de Renueva. León.*

### Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 20 años sin antecedentes patológicos, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos, acude a consulta de su médico de Atención Primaria refiriendo cefalea en región hemicraneal derecha que no cede con analgesia habitual. Con sospecha diagnóstica de migraña se decide derivar a Urgencias Hospitalarias donde se consulta a Neurología e instauran tratamiento con rizatriptán y Enantyum. Los síntomas no ceden y la paciente vuelve a acudir a Urgencias a los tres días, esta vez acompañándose de rinorrea y lagrimeo derecho de unos 5-10 minutos de duración y en número de 4-12 episodios al día que no ceden con el tratamiento administrado.

**Exploración y pruebas complementarias:** A la exploración se observa ptosis del ojo derecho y rinorrea ipsilateral sin signos meníngeos ni evidencia de focalidad neurológica. Analítica: normal. TC craneal: sin hallazgos patológicos.

**Juicio clínico:** Hemicránea paroxística.

**Diagnóstico diferencial:** Migraña, cefalea en racimos, síndrome SUNCT.

**Comentario final:** La hemicránea paroxística es una entidad clínica caracterizada por cefalea unilateral de distribución trigeminal de duración aproximada 2-30 minutos y frecuencia de 6-40 veces al día acompañada de síntomas autonómicos. Su prevalencia es de 1 por cada 25.000. La respuesta espectacular a la indometacina se considera criterio diagnóstico. La paciente fue diagnosticada finalmente de esta patología y a los 20 minutos de administrar indometacina mejoró de forma significativa confirmando el diagnóstico.

### Bibliografía

1. Matharu MS, Cohen AS. Paroxysmal hemicranias: Clinical features and diagnosis. *Uptodate*, 2016.
2. Higes Pascual F, Cubilla Salinas MA, Yusta Izquierdo A. Cefalea (III): cefalea en racimos, secundarias, farmacológicas y respondedoras a indometacina. *Medicine*. 2015;11:4167-83.
3. Goadsby PJ, Raskin NH. Cefalea. En: Barnes PJ. Longo DL, Fauci AS, et al, eds. *Harrison principios de Medicina Interna*, 18<sup>a</sup> ed. México: McGraw-Hill, 2012:124.

**Palabras clave:** Cefalea. Hemicránea paroxística.