



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/2732 - ¡Tengo que hacer fuerza para hablar!

J.J. Ballesteros Pérez^a, J.A. Castiñeiras Morachos^b, O. Guta^c, F.J. Juárez^d, P. Peleato Iñarrea^d, Y. Barroso Caballero^e, E. Salvatierra Pérez^f y M. Lamas Nogales^c

^aMédico de Familia. Centro de Salud Valtierra. Navarra. ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud CASCANTE. Tudela. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Tudela-Este. Navarra. ^dMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud CASCANTE. Navarra. ^eMédico de Familia. Urgencias Hospital Reina Sofía. Navarra. ^fMédico de Familia. Urgencias. Tudela.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 40 años sin Antecedentes Familiares de interés consulta por disfonía de 3 semanas de evolución que coincide con una infección respiratoria que se resuelve persistiendo la disfonía, refiere atragantamiento continuo, visto por MAP quien dio ABT y mucolíticos y por último corticoides, ante la no mejoría de la disfonía se la remite a ORL donde ven parálisis recurrente izquierda pos infecciosa tratan con hidroxil y dacortin. Se solicita pruebas de imagen detectando adenopatías y patología tiroidea por lo que se realiza Eco PAAF y analítica encontrándose un Ca de tiroides y se remite a Endocrinología. La paciente se encuentra con BEG y no presenta más síntomas tras Tiroidectomía total, realizar una buena rehabilitación

Exploración y pruebas complementarias: Orofaringoscopia: normal. Nasofibrofaringoscopia: morfológicamente normales con leve parecida a CVI. Rx tórax: sin alteraciones. Tiroides: LTI: nódulo de 1,5 cm. TAC: nódulo LTI, adenopatías paratraqueales Eco-PAAF: sospechoso de cáncer de tiroides. 2º PAAF: atipia celular pseudoinclusiones intranucleares sugestivo de carcinoma papilar. Analítica: tiroglobulina 9.905, calcidiol 13, TSH: 3,08. Tiroglobulina: 0,69, calcidiol: 11, antitiroglobulina: 6,49, TSH: 1,54 (2016). Resto analítica dentro de la normalidad

Juicio clínico: Cáncer papilar de tiroides.

Diagnóstico diferencial: Absceso periamigdalino. Nódulos vocales. Tiroiditis subaguda.

Comentario final: El cáncer papilar de tiroides es el más común. Se caracteriza por su presentación clínica típica de indolencia en comparación con otras neoplasias tiroideas. De crecimiento lento mantiene un pronóstico excelente. De hecho, es el que mejor pronóstico presenta, siendo su tasa de supervivencia a 20 años superior al 90%. Es importante mantener un seguimiento de por vida con endocrino, para valoración de niveles hormonales.

Bibliografía

- Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J. Estimates of global cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. Int J Cancer. 2013;132:1133-45.

Palabras clave: *Incidentaloma tiroideo: Nódulo tiroideo.*