Semergen. 2016;42(Espec Congr 15):5

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

# 212/2689 - Prevalencia de pacientes EPOC en CS El Valle de Jaén. Vacunación antineumocócica y tabaquismo

*E. Sánchez Torres*[a], *L. Frutos Muñoz*[b] *y M. Ruiz Ruiz*[a]

[a]*Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria;* [b]*Médico de Familia. Centro de Salud el Valle. Jaén.*

## Resumen

Objetivos: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la primera causa de muerte evitable en España. Su prevalencia aumenta cada año por dos causas principalmente: infradiagnóstico y el inicial desarrollo en personas que comenzaron a fumar hace 20-30 años. Se realizó un estudio observacional transversal en pacientes EPOC del CS El Valle con el objetivo de conocer su relación con el tabaco y la existencia de vacunación antineumocócica o no.

Metodología: Se llevó a cabo una auditoria en el centro de salud sobre la base de datos Diraya para identificar los pacientes EPOC, su hábito tabáquico y vacunación antineumocócica.

Resultados: Existen un total 314 pacientes con diagnóstico de EPOC. De ellos el 73% (229 pacientes) presentan registro tabáquico (fumadores o no fumadores); Siendo fumadores o ex-fumadores el 87% de este registro (200 pacientes). Han sido vacunados con vacuna antineumocócica 77 pacientes, es decir, el 39%.

Conclusiones: Una de las conclusiones de este estudio es que hay aproximadamente un tercio de pacientes con diagnostico EPOC sin registro tabáquico, a pesar de ser el tabaco la causa principal y directa de esta enfermedad. Otra es el pequeño porcentaje de pacientes EPOC vacunados con vacuna antineumocócica, que se recomienda en ellos, ya que son pacientes de alto riesgo debido a su daño en la vía aérea y respuesta inmunitaria reducida.

*Palabras clave: EPOC. Tabaco. Vacuna. Neumococo.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.