



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/575 - Métodos de suicidio de elección y efectividad de los mismos

J. Sara Rivero^a, J. Martín López^b, B. Martín López^c y J. Barea Mañas^d

^aMédico de Familia. Central de Coordinación Gau-061. Mallorca. ^bTelefonista. Gau-061. Mallorca. ^cPsicóloga Atención Primaria. Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria. Mallorca. ^dTécnico en Emergencias Sanitarias. UTE Transporte Sanitario de Mallorca Nº 1. Mallorca.

Resumen

Objetivos: Los objetivos del estudio consisten en identificar métodos de elección por parte de los pacientes que solicitan ayuda sanitaria extrahospitalaria al GAU-061 Baleares antes o una vez llevado a cabo el intento autolítico y si hay relevancia entre el método de elección y el resultado de exitus, es decir, que el incidente finalice como un suicido consumado.

Metodología: Muestra: llamadas recibidas en el año 2012 (382.797) que generaron un total de 83.559 incidentes, de los cuales 8.233 se clasificaron o tuvieron como CIE patología psiquiátrica. De estos 8.233 incidentes 801 fueron clasificados o tuvieron como CIE intento autolítico. Instrumentos: Paquete estadístico IBM SPSS Statistics V.20. Procedimiento: metodología descriptiva longitudinal.

Resultados: Los datos de la muestra global nos indican que en un 43,7% de los casos analizados el motivo de la llamada fue inicialmente “Amenaza de autolisis”, es decir 350 casos. Un 18,7% de las alertas que recibió el GAU-061 fueron por intoxicación por fármacos o sustancia medicamentosa. En un 4,5% de las alertas esta circunstancia se confirmó tras la asistencia del equipo asistencial. Hubo un total de 37 exitus atendidos en el sistema de emergencias prehospitalarias.

Conclusiones: El 9,7% de los incidentes con clasificación o CIE de patología psiquiátrica que atiende el GAU-061 Baleares está relacionado intentos de autolisis, amenaza de suicidio o suicido. En un 23,2% de los incidentes los pacientes habían realizado una intoxicación por fármacos o sustancia medicamentosa, aunque sólo en 1 caso tuvo resultado de exitus. De los pacientes que realizaron un intento de autolisis efectivo, el 27% fue por ahorcamiento. Los métodos de elección con resultado de exitus fueron principalmente: ahorcamiento y precipitado.

Palabras clave: Autolisis. Suicidio. Intoxicación. Medicina extrahospitalaria.