



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/2227 - Grado de prevención y control del tabaquismo en OSI ARABA 2016

M.L. Ruiz Macho^a, G. Mediavilla Tris^b, J. Iturrealde Iriso^c, I. de la Cruz Souto^d, J. Doñate Avial^e, H. García Miranda^f, R. Lago Souto^g, L. Lanzagorta Ovelleiro^h, A. Lluesma Guillén^h y E. Ugarriza Lado^d

^aMédico de Familia. Centro de Salud Lakua-Arriaga. Vitoria-Gasteiz. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Arambizcarra I. Vitoria-Gasteiz. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Casco Viejo. Vitoria-Gasteiz. ^dMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Olarizu. Vitoria-Gasteiz. ^eMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zabalgana. Vitoria-Gasteiz. ^fMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Martín. Vitoria-Gasteiz. ^gMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lakuabizkarra. Vitoria-Gasteiz. ^hMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz.

Resumen

Objetivos: Aunque estamos avanzando mucho a nivel español y europeo en prevención y control del tabaquismo, nuestro país se sitúa aún en la banda media alta europea por proporción de personas que fuman en la población general. En nuestro trabajo habitual debemos interrogar a todas las personas mayores de 14 años, al menos cada dos años sobre su consumo o no de tabaco cuantificándolo. Además nuestra Oferta Preferente nos indica que como criterios de buena atención (CBA) en la historia clínica del fumador se le realizará cada dos años un diagnóstico de su motivación al abandono según modelo Prochaska. Se le dará además consejo para el abandono como mínimo también cada dos años y registraremos a las personas ex fumadoras.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo realizado en abril de 2016 en OSI Araba (302.572 pacientes, de los que 261.734 son mayores de 14 años). Se utilizó el Programa Osabide para evaluar el grado de cumplimiento de los CBA en relación con el tabaquismo.

Resultados: Cribado (> 14 años cada 2 años): 75,01%. Prevalencia mayores de 14 años: 20,67%. Diagnóstico de motivación (2 años): 52,19%. Consejo (2 años): 54,10%. Exfumadores: 11,51%.

Conclusiones: Sabemos que el objetivo marcado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo integrado por 32 sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito sanitario (CNPT) es el de lograr que en 2040 la proporción de fumadores no supere el 5%, vemos que aún estamos lejos (20,67%). Aunque el porcentaje de cribado creemos que es bueno, deberemos esforzarnos más en el consejo para lograr el abandono del tabaquismo en una mayor proporción.

Palabras clave: Tabaquismo. Atención Primaria.