



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/1868 - Estudio comparativo sobre el tabaquismo entre MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y el resto de especialidades en Extremadura

M.Á. Fandiño Márquez^a, A.M. Aragón Merino^b, M. Turégano Yedro^c, A. Bellido Maldonado^d, M.J. Jurado Mancheño^e, M. Hidalgo García^d, J.A. Riesco Miranda^f y D. Igual Fraile^g

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; ^bMédico de Familia. Centro de Salud Manuel Encinas. Cáceres. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona Centro. Cáceres. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Jorge. Cáceres. ^dMédico Residente. Servicio de Neumología; ^fMédico Neumólogo. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. ^eMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Aldea Moret. Cáceres.

Resumen

Objetivos: Realizar una comparación de la prevalencia del hábito tabáquico entre los MIR de MFyC y los MIR del resto de especialidades de Extremadura en el año 2015.

Metodología: Realizamos un estudio epidemiológico descriptivo mediante cuestionarios anónimos autoadministrados sobre el consumo tabáquico entre los MIR de MFyC y del resto de especialidades en Extremadura. Analizamos variables: sexo, condición de fumador activo (FA), exfumador (EF) y nunca fumador (NF), que se recopilaron en una base de datos y se analizan mediante el programa estadístico SPSS.

Resultados: Realizamos 275 encuestas de las que 86 (31,27%) corresponden a MIR de MFyC y 189 (68,73%) al resto de especialidades. El porcentaje de FA es ligeramente mayor en MIR de MFyC que del resto de especialidades (17,44% y 16,93% respectivamente), al igual que los EF (11,63% y 8,46% respectivamente); siendo mayor los NF en el resto de especialidades (74,60% frente al 70,93% de MFyC). Preguntados si consideran el tabaquismo una enfermedad, el porcentaje de MFyC es mayor (77,90%) frente al resto de especialidades (68,78%).

Conclusiones: El porcentaje de FA y EF es mayor en MIR de MFyC que en el resto de especialidades. Los MIR de MFyC consideran el hábito tabáquico una enfermedad más frecuentemente que los MIR del resto de especialidades.

Palabras clave: Prevalencia. Tabaquismo. MFyC. Especialidades.