



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/3657 - Doctor, no siento las piernas

J. Sorando Ortín<sup>a</sup>, J. Barrio Cortés<sup>a</sup>, M. Gómez Rodríguez<sup>b</sup>, C.I. Ruiz Morollón<sup>c</sup> y E. Blanco Basilio<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia; <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Madrid. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Santa Hortensia. Madrid. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Goya. Madrid.

### Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 44 años fumador de 20 cigarrillos/día sin otros antecedentes de interés que acude de urgencia a consulta por paraparesia, hipoestesia en silla de montar y disfunción eréctil desde hace 4 horas. Sin otra focalidad neurológica. No fiebre, ni tiritona. Ninguna otra clínica asociada. Valorado el día previo refiriendo únicamente estreñimiento y dolor en región anal de 5 días de evolución.

**Exploración y pruebas complementarias:** Afebril, buen estado general, eupneico en reposo. ACP: rítmica sin soplos, MVC. Abdomen: anodino. Tacto rectal muy dificultado por dolor: Esfínter hipertónico por defensa voluntaria, no se palpan masas ni otras lesiones. Neurológica: CyOx3, alerta y colaborador, pares craneales normales, fuerza y sensibilidad en MMSS conservada, paresia IV/V en MMII, hiporreflexia generalizada, no dismetría ni disdiadiocinesia, Hipoestesia en silla de montar. Romberg negativo. Marcha alterada con base de sustentación aumentada. Se deriva a Urgencias siendo valorado por Neurología realizándose analítica de sangre (leucocitosis y neutrofilia), SO normal, Rx tórax normal y RMN con angiomas vertebrales sin hallazgos de lesión medular. Durante su estancia en Urgencias aparición de intenso dolor perianal y fiebre de 38,7 °C, por lo que se avisa a cirugía que aprecia en nuevo tacto rectal facilitado por sedación un absceso isquierdorctal que precisó intervención quirúrgica urgente.

**Juicio clínico:** Absceso isquierdorctal y fistula perianal

**Diagnóstico diferencial:** Mielitis aguda o compresión medular (neoplasia, hematoma epidural espontáneo, absceso, hernia), Guillain–Barré, accidente cerebrovascular de tronco, miopatías inflamatorias, gangrena de Fournier.

**Comentario final:** Los abscesos de la región anorrectal constituyen un motivo de consulta frecuente; pueden tener un origen glandular o ser secundario a otros procesos (enfermedad inflamatoria intestinal, carcinoma, cuerpos extraños, tuberculosis, actinomicosis...). El síntoma predominante es dolor que se acompaña de tumoración perianal, pudiendo complicarse con infección perineal, sepsis y muerte. La clínica neurológica es infrecuente y se produce por compresión de las fibras nerviosas del área. El diagnóstico es clínico destacando la importancia de una adecuada exploración física y el tratamiento quirúrgico y antibiótico.

### Bibliografía

1. Jiménez-Murillo L. Medicina de Urgencias y Emergencias, 5<sup>a</sup> ed.
2. Vázquez Lima MJ. Guía de actuación en Urgencias, 3<sup>a</sup> ed.
3. Ramos Rodríguez J, Ciga Lozano M. Manual AEC de Proctología para Atención Primaria, 2014.

*Palabras clave:* *Absceso. Paraparesia. Hipoestesia. Estreñimiento.*