Semergen. 2016;42(Espec Congr 15):24

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

212/3126 - No se me quita la fiebre

V. Santos Urrutia[a], M.Á. López Gil[b], J.A. Centeno Águila[c], A. Santos Urrutia[d], R. Grande Grande[e], S. Pardo del Olmo Saiz[f], M.S. Piris Santamaría[g], M.Á. Ruíz Guerra[d] y E. González Cifuentes[b]

[a]Médico de Familia. Centro de Salud Linarejos. Jaén. [b]Médico de Familia. Centro de Salud Guarromán. Jaén. [c]Enfermero. Centro de Salud Arrayanes. Linares. Jaén. [d]Médico de Familia. Centro de Salud Alto Campoo. Cantabria. [e]Médico de Familia. Centro de Salud Solares. Cantabria. [f]Médico de Familia. Centro de Salud Camargo Interior. Cantabria. [g]Médico de Familia. Centro de Salud Cotolino. Cantabria.

Resumen

Descripción del caso: Paciente varón de 57 años de edad, fumador de un paquete diario y bebedor de 2 cervezas diarias que consulta por fiebre de predominio vespertino de tiempo de evolución de unos 6-7 meses, astenia y pérdida de peso 3-4 kg desde hace 3-4 meses. Niega cuadro catarral ni infección urinaria. No alteración del ritmo intestinal. Nicturia. Exploración normal, analítica y Rx tórax normal. Se deriva especialista.

Exploración y pruebas complementarias: Exploración: normal, no signos meníngeos, buena coloración, no adenopatías, no erupciones cutáneas, no dolor, no disnea. Auscultación normal sin ruidos añadidos. Abdomen normal, blando, depresible, sin masas ni megalias.

Juicio clínico: Neoplasia renal. Nódulo pulmonar cavitado con biopsias negativas para malignidad.

Diagnóstico diferencial: Quistes renales. Angiomiolipoma. Linfoma. Metástasis.

Comentario final: Neoplasia más frecuente en el riñón y corresponden el 2% de cánceres en adultos. La incidencia es más frecuente en países industrializados. La clínica de inicio es variada y común a distintas patologías. En sus estadios tempranos, el cáncer de riñón no provoca dolor. Los síntomas de la enfermedad suelen aparecer cuando el tumor es grande y afecta los órganos cercanos. Por eso, a veces, las

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

personas con este tipo de cáncer no presenta ninguno síntoma. La tríada clásica del cáncer de riñón es sangre en la orina, dolor en un flanco y la aparición de una masa abdominal. A esta tríada se le conoce como la tríada demasiado tarde, la enfermedad ha avanzado más allá de un punto curativo.

Bibliografía

1. Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg. 2004;93:88-96.
2. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol. 2007;18:581-92.
3. Gill IS, Aron M, Gervais DA, Jewett MA. Small renal mass. N Engl J Med. 2010;362:624-34.

Palabras clave: *Neoplasia renal. Diagnóstico diferencial.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.