



242/4183 - EFECTIVIDAD DEL CONSEJO VACUNAL DE NEUMOCÓCICA 13 VALENTE

M. Maestro Ibáñez^a, J. Breva Aymerich^b, M. Novés Nadal^c, P. Hsu^d, E. Ras Vidal^e y M. Darvari^f

^aMédico de Familia. Centro de Salud Reus 3. Tarragona. ^bMédico de Familia. CAP Horts de Miró. Reus. Tarragona. ^cMédico de Familia. CAP Montblanc. Tarragona. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Reus 2. Tarragona. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Sant Pere. Reus. Tarragona. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Constantí. Tarragona.

Resumen

Objetivos: Valorar la efectividad en el consejo sobre vacunación antineumocócica 13 valente en población mayor de 60 años durante 3 meses de seguimiento.

Metodología: Estudio realizado en 2 Centros de Salud de Atención Primaria. Variables: número total de pacientes que se les realizó el consejo vacunal con vacuna antineumocócica de polisacáridos conjugados 13 valente, al azar y ya sea con/sin indicación de financiación. De estos: edad, fecha de consejo, factores de riesgo (indicaciones no financiadas): enf. cardíacas, DM2, MPOC, enf. hepáticas y alcoholismo. Indicaciones financiadas: pacientes inmunodeprimidos; enf. renal o síndrome nefrótico, tratamiento inmunosupresor, quimioterapia, radioterapia, enf. reumatológicas autoinmunes, trasplante de órgano/cels hematopoyéticas, enf. de Hodgkin, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, VIH, asplenia, portador de fístula LCR, implantes coclear. A los 3 meses de la fecha del consejo se realizó una revisión vacunación/no vacunación. Estudio longitudinal retrospectivo. Análisis estadístico mediante tablas de frecuencia y descriptivos de todos los datos.

Resultados: Se les realizó el consejo vacunal a un total de 230 pacientes, con una edad media de 67,35 años. En el caso de indicación no financiada: enf. cardíacas 64,7%, DM2 22,4%, EPOC 24,4%, enf. hepáticas 3,8%, alcoholismo 3,5%. Indicaciones financiadas: enf. renal/síndrome nefrótico 10,3%, tratamiento inmunosupresor/quimioterapia/radioterapia 6,4%, enf. reumatológicas autoinmunes 11,5%, trasplante de órgano/cels hematopoyéticas 0%, enf. de Hodgkin/leucemia/linfoma 0%, mieloma múltiple 0%, VIH 0,6%, asplenia 0,6%, portador de fístula LCR 0%, implante coclear 0%. Finalmente se vacunaron 30 (13%), de los cuales 14 (6%) correspondían a indicaciones financiadas y 16 (7%) a vacunaciones únicamente tras indicación de su MAP.

Conclusiones: Pese a las bajas tasas de vacunación posconsejo, las cifras de vacunados obtenidas por profesionales implicados de manera aislada, aumentaban exponencialmente las cifras de vacunados respecto a la cifras iniciales del estudio, lo cual podría hacernos estimar la potencia de consejo vacunal en el caso de que este se hiciera por parte del médico y la enfermera.

Palabras clave: Vacuna. Vacunación antineumocócica 13 valente. Factores de riesgo. 1138-3593 / © 2017 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.