



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/3341 - MANEJO DE LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA DE POLISACÁRIDOS POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE BARCELONA CIUDAD

M. Vicente Fernández^a, M. Hernando Monge^a, C. Boté Fernández^b, C. Campos García^b, R. Rodríguez Portillo^a y M. Chorén Freire^b

^aMédico de Familia. EAP 9H San Andrés. Barcelona. ^bDiplomada en Enfermería. EAP 9H San Andrés. Barcelona.

Resumen

Objetivos: Conocer el manejo de la vacuna antineumocócica de polisacáridos por parte del personal sanitario de AP Barcelona Ciudad en la población atendida.

Metodología: Estudio descriptivo transversal multicéntrico. Mediante el análisis del formulario enviado por correo electrónico a los profesionales sanitarios que prestan servicios en la Atención Primaria de Barcelona Ciudad, se quiere conocer el manejo de la vacuna antineumocócica de polisacáridos en la población atendida. El cuestionario consta de un test de preguntas sociodemográficas, académicas y laborales categóricas de respuesta múltiple, y preguntas abiertas sobre la administración de la vacuna antineumocócica de polisacáridos.

Resultados: De los cuestionarios recibidos, 1.371 cumplen criterios de validez para todas las cuestiones planteadas. La cobertura vacunal entre el personal encuestado es realizada a pacientes con neoplasia a cualquier edad (21%), en patología respiratoria a cualquier edad (49%), en personas fumadoras (22%), mayores de 65 (73%) patología cardíaca (11%) tras sufrir una neumonía (79%). Las dosis administradas son dosis única independientemente de la edad (68%), dos dosis a sujetos entre 60 y 65 años (43%), una dosis a los 65 independientemente de las recibidas con anterioridad (13%), tras neumonía con diferencia siendo menor o mayor de 65 (27 y 42% respectivamente).

Conclusiones: Existe discrepancia en la administración de la vacuna antineumocócica de polisacáridos tanto en edad de administración como dosis administradas. Como equipo nos planteamos unificar criterios de indicación y valorar la actuación en las recomendaciones.

Palabras clave: Vacunación. Vacuna antineumocócica de polisacáridos. Dosis. Revacunación.