



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/2061 - DISLIPEMIA Y ESTADO PROINFLAMATORIO EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

J. Rodríguez Cristóbal^a, S. Benedetti^b, M. Guzmán Martín^b, J. Pérez Santos^a, E. Rodero Pérez^c y G. Miranda Arostegui^d

^aMédico de Familia. CAP Florida Sud. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Florida Sud. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Florida Nord. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Prat de Llobregat. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Resumen

Objetivos: Determinar perfil lipídico y parámetros inflamatorios en pacientes con sobrepeso y obesidad.

Metodología: Los pacientes se clasificaron según el grado de sobrepeso y obesidad. Se estudiaron marcadores antropométricos. Se realizaron análisis del perfil lipídico y factores inflamatorios.

Resultados: 755 pacientes (77,19% mujeres), edad media 56,5 años. Observamos que cuanto era la clasificación del sobrepeso y obesidad, los triglicéridos y el ácido úrico aumentaron de forma significativa (99,68-137,20, p 0,002; 4,47-4,80; p 0,003). No hay variaciones significativas en cuanto el colesterol total y LDL. Así también encontramos un aumento significativo del fibrinógeno y proteína C reactiva (317,51-365 mg/dl; p 0,01, 2,57-7,1 p 0,0001).

Conclusiones: El sobrepeso y obesidad aumentan la dislipemia y factores inflamatorios. Es importante tener un control de estos parámetros en dichos pacientes para prevenir posibles eventos cardiovasculares.

Palabras clave: Obesidad. Dislipemia. Factores inflamatorios. Riesgo cardiovascular.