



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/340 - AMORES QUE MATAN

N. Gómez Caballero<sup>a</sup> y A. Tévar Terol<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 3<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Florida. Alicante. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Florida. Alicante.

### Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 32 años sin antecedentes de interés, que acude a consulta de Atención Primaria por presentar un cuadro de malestar general, con sensación distérmica, y con dolor en oído izquierdo. Se objetiva el CAE con signos inflamatorios, se pauta Augmentine y antiinflamatorios. A los días acude y nos cuenta que tras 5 días de la toma de Augmentine acudió a urgencias hospitalaria con su novia, de 31 años alérgica al Augmentine, con un cuadro de malestar general, vómitos y erupción cutánea tras haber transcurrido 30 minutos después de haber mantenido relaciones sexuales, incluido sexo oral.

**Exploración y pruebas complementarias:** En urgencias hospitalarias: a su llegada a urgencias la novia comienza con vómitos alimentarios, y con mal estado general. Presenta PA de 110/74, y con saturación de 98%. Con un exantema cutáneo pruriginoso generalizado. ACP: rítmica, MVC con algún sibilante. No se aprecia edema de glotis. Se inicia tratamiento con adrenalina, con corticoides y con aerosolterapia con salbutamol. Analítica de sangre: normal. ECG: anodino. Tras permanecer en observación de urgencias, se decide el alta hospitalaria.

**Juicio clínico:** Anafilaxia.

**Diagnóstico diferencial:** Urticaria idiopática. Angioedema por IECA. Asma.

**Comentario final:** La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad generalizada. Las causas son los alimentos, los fármacos, y las picaduras. Se sospecha por afectación de la piel y/o mucosas junto con compromiso respiratorio. La triptasa sérica es útil para el diagnóstico. Los escasos datos disponibles indican que los beta-lactámicos, debido a su carácter de moléculas polares y ácidos débiles, alcanzan concentraciones bajas en el tejido y líquido prostáticos. La concentración en líquido seminal es más escasa, pero la relación líquido seminal/plasma podría ser mayor. Así que no puede descartarse una reacción de hipersensibilidad a amoxicilina tras la ingesta de semen, ya que no es dosis-dependiente.

### Bibliografía

1. Marques L, Baltasar MA, Granel C, Guspí R. Anafilaxia. En Pelaez A, Dávila I, eds. Tratado de alergología SEAIC. Madrid: Ergon, 2007: 1633-55.
2. Golden D. What is Anaphylaxis? Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2007;7: 331-6.

**Palabras clave:** Hipersensibilidad.