



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/4415 - HÁBITAT, NIVEL DE EDUCACIÓN, NIVEL ECONÓMICO Y SITUACIÓN LABORAL DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR INCLUIDOS EN EL ESTUDIO IBERICAN

M. Turégano Yedro^a, J. Polo García^b, J. Torres Vázquez^c, P. Valiente Maresca^d, J. Vázquez Gallego^e y C. Zárate Oñate^f

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Jorge. Cáceres. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Casar de Cáceres. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Villanueva del Fresno. Badajoz. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Illescas. Toledo. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Sector III. Getafe. Madrid. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Goya. Madrid.

Resumen

Objetivos: Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así como de los eventos cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo es analizar las características de los pacientes con fibrilación auricular (FA) incluidos en el estudio IBERICAN. Se analizaron las características sociodemográficas (hábitat, nivel de educación, nivel económico y situación laboral) de los pacientes con FA.

Metodología: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en el que se están incluyendo pacientes de 18 a 85 años atendidos en las consultas de Atención Primaria en España, que serán seguidos durante al menos 5 años. La muestra final estimada es de 7.000 pacientes.

Resultados: El corte analizado ($n = 5.941$) presentó una prevalencia de fibrilación auricular (FA) del 5,5% ($n = 329$). La edad media es $69,6 \pm 12,06$ años. El hábitat más frecuente de los pacientes con FA fue el urbano (> 20.000 habitantes), 53,4%, el semiurbano (entre 5.000 y 20.000 habitantes) 25,3% y rural (5.000 habitantes) el 21,3% de los casos. El nivel de educación, en los pacientes con FA fue: sin estudios (19,8%), estudios primarios (59,3%), estudios superiores (12,8%) y estudios universitarios (8,2%). El nivel económico de los pacientes divididos en tres grupos en función de la renta anual: renta menor de 18.000 euros (56,7%), entre 18.000 y 100.000 euros (42,1%), o mayor de 100.000 euros (1,2%). La situación laboral, el grupo de los jubilados fue el más frecuente (68,1%) trabajadores (12,1%), parados (6,1%), estudiantes (0,3%), tareas domésticas (13,4%).

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio muestran que los pacientes con FA incluidos presentan una media de edad similar a estudios previos a nivel nacional. Además apreciamos cómo en la situación laboral los jubilados constituyen el grupo de personas más prevalente debido a que media de edad de los pacientes con FA incluidos es elevada. Podemos concluir que el perfil del paciente con FA en nuestro estudio es jubilado, con estudios primarios, hábitat normalmente urbano y con renta anual baja o media.

Palabras clave: Fibrilación auricular. Estudio IBERICAN.