



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/4432 - PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR PREVIA DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO IBERICAN

E. Domínguez Fernández^a, J. Soto Olvera^b, A. Suárez Domínguez^c, M. Sureda Barbosa^d, M. Tejero Mas^e y S. Cinza Sanjurjo^f

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Noia. La Coruña. ^bMédico de Familia. Centro de Salud San Roque. Badajoz. ^cMédico de Familia. Centro de Salud de Noia. La Coruña. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Camí Nou de Son Cladera. Baleares. ^eMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Paz. Badajoz. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Porto do Son. Santiago de Compostela. La Coruña.

Resumen

Objetivos: Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así como de los eventos cardiovasculares. El objetivo específico de la presente comunicación es conocer la prevalencia de enfermedad renal en los pacientes con enfermedad cardiovascular incluidos en el estudio.

Metodología: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en el que se están incluyendo pacientes de 18 a 85 años atendidos en las consultas de Atención Primaria en España, hasta obtener una muestra de 7.000 pacientes, que serán seguidos durante al menos 5 años. Se presentan las características basales del quinto corte ($n = 6.007$). Se clasificaron los pacientes en prevención secundaria cuando presentaron cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, ictus o enfermedad arterial periférica. Se asumió enfermedad renal a través de la estimación del FG por la fórmula CKD-EPI, si era 60 ml/min; también se calculó la albuminuria a través del cociente albúmina/creatinina en orina.

Resultados: La edad media de los sujetos incluidos es $57,4 \pm 15,5$ años, y el 54,5% mujeres. El 16,2% de los pacientes presentaban una enfermedad cardiovascular previa. La enfermedad cardiovascular fue más frecuente en varones (54,4% vs 43,8%, $p < 0,001$) y en pacientes de mayor edad ($64,7 \pm 13,7$ vs $56,0 \pm 15,5$, $p < 0,001$). Tanto la enfermedad renal (16,2% vs 6,6%, $p < 0,001$) como la albuminuria (15,3% vs 6,7%, $p < 0,001$) fueron más frecuentes en pacientes con ECV. Si analizamos simultáneamente ambas lesiones, la presencia de enfermedad renal aislada (10,5% vs 5,4%, $p < 0,001$), la albuminuria aislada (9,7% vs 5,7%, $p < 0,001$) y ambas simultáneas (5,7% vs 1,2%, $p < 0,001$) fueron más frecuentes en pacientes con ECV.

Conclusiones: La cohorte IBERICAN incluye pacientes relativamente jóvenes, con predominio de mujeres, pero la presencia de enfermedad cardiovascular previa en una quinta parte de la muestra condicionará el pronóstico de la cohorte. Otro condicionante en el pronóstico de estos pacientes será, sin duda, la elevada coexistencia de la enfermedad renal.

Palabras clave: IBERICAN. Enfermedad renal. Patología cardiovascular.