



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/4437 - PREVALENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO IBERICAN

J. Polo García<sup>a</sup>, M. Turégano Yedro<sup>b</sup>, J. Mínguez Villar<sup>c</sup>, M. Novoa Gómez<sup>d</sup>, A. Palmerín Donoso<sup>e</sup> y J. Palomo del Arco<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Casar de Cáceres. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Jorge. Cáceres. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud la Tórtola. Valladolid. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Cerverá del Maestre. Castellón. <sup>e</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Valdepasillas. Badajoz. <sup>f</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Guijuelo. Salamanca.

### Resumen

**Objetivos:** Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así como de los eventos cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo es analizar las características de los pacientes con fibrilación auricular (FA) incluidos en el estudio IBERICAN y compararlas con otros estudios nacionales previos.

**Metodología:** IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en el que se están incluyendo pacientes de 18 a 85 años atendidos en las consultas de Atención Primaria en España, que serán seguidos durante al menos 5 años. La muestra final estimada es de 7.000 pacientes.

**Resultados:** De los 5941 pacientes incluidos, 329 (5,5%) tenían FA (intervalo de confianza del 95%; 4,93-6,10); la edad media de  $69,6 \pm 12,06$  años; por sexos, 182 fueron varones y 147 mujeres, con una prevalencia superior en varones (6,6%) respecto a las mujeres (4,5%), p 0,001.

**Conclusiones:** Los resultados de nuestro estudio muestran que los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN presentan una prevalencia de FA mayor que la observada en otros estudios nacionales, como el estudio ofrece. Además observamos una mayor prevalencia de fibrilación auricular en hombres.

**Palabras clave:** Fibrilación auricular. Estudio IBERICAN.