



242/1629 - MACULO-PÁPULAS DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO EN UNA NOCHE DE VERANO

J. Rodríguez Cámara^a, A. Pascual Vergara^a y N. Pereña Molina^b

^aMédico de Familia. Centro de Salud Ronda Norte. Málaga. ^bDUE. AGS Serranía de Málaga.

Resumen

Descripción del caso: Paciente de 31 años, que acude a las urgencias de nuestro de salud a las 2:00h am, por presentar desde la mañana varias lesiones dérmicas muy pruriginosas en miembro inferior izquierdo, no refiere picaduras, ni contacto con animales o estancia en el campo. Acude preocupada cada vez tiene más lesiones.

Exploración y pruebas complementarias: Lesiones maculo-pápulas eritematosas bien delimitadas formando placas de pequeño tamaño infiltradas, que no desaparecen a la vitro-presión, muy pruriginosas con dermatografía negativa en cara interna de gemelo izquierdo. No se aprecia punto de inoculación de veneno por picadura, ni marcas de ningún tipo sobre las lesiones. Ante la dificultad para establecer un claro diagnóstico ofrecemos la posibilidad de biopsiar la lesión, y realizarle un seguimiento en nuestra consulta a los 10 días. Procedemos a realizar biopsia de piel con punch de 0,4 mm, que a los 10 días nos informan de intensa inflamación linfocitaria perivascular en dermis sin afectación epidérmica con gran cantidad de eosinófilos de predominio intersticial compatible con reacción a veneno de artrópodos. Tras biopsia ponemos de tratamiento Prednicarbato tópico una aplicación cada 12 horas durante 10 días, prednisona 30 mg en dosis decreciente durante 10 días.

Juicio clínico: Reacción dérmica a distancia a veneno de artrópodo que evolucionó muy favorablemente, permaneciendo asintomática y sin ninguna lesión actualmente.

Diagnóstico diferencial: Eritema polimorfo, liquen plano, morfea en placas.

Comentario final: El veneno de los artrópodos puede provocar reacciones dérmicas polimorfas a distancia de difícil diagnóstico que debemos de tener en cuenta sobre todo en época estival. Y gracias a técnicas como la biopsia cutánea que podemos realizar desde atención primaria nos permite dar un diagnóstico y tratamiento completo al paciente, desde la cercanía que ofrece la medicina de familia.

Bibliografía

1. Martínez-Molero MI. Round Table: Urticaria caused by arthropod bites and stings (excluding Hymenoptera). Allergol Immunopathol (Madr). 1999;27(2):96-104.
2. Pastrana J, Blasco R, Erce R, Pinillos MA. Animal Sting and bites. Anales Sis San Navarra.

2003;26(Supl. 1):225-42.

Palabras clave: Biopsia. Artrópodos. Veneno.