



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/2883 - ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CICATRIZACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN UNA MUESTRA OBTENIDA DEL CENTRO DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS

J. Suárez Hernández^a, A. Martínez Martínez^b, A. Kikeeva^c, A. Coll Ruiz^c, M. Pérez Cáceres^d y A. Luna Maldonado^e

^aMédico Residente de Medicina Legal. Hospital Vega Baja de Orihuela. Alicante. ^bEnfermera de Residencia de Discapacitados psíquicos. ^cMédico de Familia. Hospital Vega Baja de Orihuela. Alicante. ^dMedicina Legal Universidad de Murcia. ^eCatedrático de Medicina Legal y Forense. Departamento de Medicina Legal y Forense. Universidad de Murcia.

Resumen

Objetivos: El objetivo de este estudio es observar si existe o no diferencia en el tiempo de cicatrización empleando un apósito hidroterosivo frente al empleo de los apósoitos convencionales por enfermería.

Metodología: Durante 3 meses en el Centro de Discapacitados Psíquicos se realiza curas de las úlceras de miembros inferiores por presión localizadas en talones de los pies. Las curas se realizan por parte del personal de enfermería que aplican apósoitos a dichos enfermos. Los apósoitos que se aplican son de dos clases aquellos que podemos clasificar como convencionales y otros que son hidroterosivos con fibras de poliacrilato.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 25 pacientes de edades comprendidas entre los 68 años a los 89 años de edad. Se realizó una distribución aleatoria homogeneizada de los mismos en dos grupos A (apósoitos convencionales) y grupo B (apósoitos hidroterosivos con fibras de poliacrilato). Se realizó fotografías de las úlceras al inicio del proceso de curación, al mes, a los dos meses y al tercer mes y se midió en cm la progresión del cierre de la úlcera.

Conclusiones: Se observó que aquellos pacientes pertenecientes al grupo B se producía un cierre más precoz de la úlcera que aquellos otros en los que se aplicaba el tratamiento A. La media de días que tardaba en producirse la curación, cierre de la ulceración del grupo A era 97 días. Sin embargo aquellos pacientes que fueron tratados con el tratamiento B presentaban un cierre de la ulceración a los 72 días.

Palabras clave: Úlcera por presión. Tratamiento paliativo. Apósoitos hidroterosivo. Tratamiento en institución cerrada.