



<https://www.elsevier.es/semrgen>

## 242/1457 - COMPLICACIÓN GRAVE DE LA CRISIS DE GOTA: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Moreno Rubiales<sup>a</sup>, M. Bejarano Benítez<sup>b</sup> y M. Álvarez Villegas<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ronda Histórica. Sevilla. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Alamillo. Sevilla. <sup>c</sup>Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alamillo. Sevilla.

### Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 46 años. Antecedentes personales: hipertensión arterial y gota. Acude a su médico de familia por dolor intenso en brazo izquierdo, en relación con crisis gótica de dos semanas de evolución, con fiebre desde hace 2 días. El paciente refiere toma de colchicina en los 3 últimos días sin mejoría, y no realizar tratamiento correcto con allopurinol. Se deriva a Urgencias del Hospital donde diagnostican de celulitis brazo izquierdo secundario a tofo gótico sobreinfectado, e ingresan durante varias semanas por evolución tórpida de la misma.

**Exploración y pruebas complementarias:** Paciente afectado por el dolor. Febril. Brazo izquierdo muy doloroso a la palpación debido a gran edema y enrojecimiento que se extiende desde dedos hasta tercio proximal de dicha extremidad, con absceso fluctuante en olecranon de unos 7 cm de diámetro. Movilización del mismo limitada a bajos grados. Resto de exploración sin hallazgos patológicos. Laboratorio: Leucocitosis con neutrofilia. PCR 345. Hemocultivos: negativo. Cultivo absceso: Streptococcus pyogenes. Ecografía MSI: Hallazgos en relación con cuadro infeccioso/inflamatorio que afecta a tejido celular subcutáneo y musculatura.

**Juicio clínico:** Celulitis secundaria a tofo gótico sobreinfectado.

**Diagnóstico diferencial:** Artritis séptica y pseudogota.

**Comentario final:** Destacar la importancia de controlar a los pacientes ya diagnosticados de hiperuricemia, vigilando la aparición de complicaciones articulares y extraarticulares, monitorizando los niveles de ácido úrico y el tratamiento prescrito. También asegurarse de que el paciente reciba información sobre su enfermedad, facilitando adhesión al tratamiento y una detección precoz de complicaciones, evitándose así evoluciones tórpidas de la enfermedad como ha presentado este paciente.

### Bibliografía

1. Wakefield RJ, Emery P, Pease C. Gout related upper limb cellulitis: an ultrasound study. *J Rheumatol*. 2003;30(2):417-9.
2. García-Casares E, Mateo Soria L. Fasciitis and myositis caused by streptococcal flesh-eating bacteria. *J Clin Rheumatol*. 2010;16(8):382-4.

**Palabras clave:** Gota. Celulitis. Hiperuricemia.