



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/4261 - A PROPÓSITO DE UN CASO DE DOLOR COSTAL

F. Pacheco Ugarte^a, L. García Franco^b y A. García del Campo^c

^aMédico de Familia. Centro de Salud Castropol. Asturias. ^bEnfermera Atención Primaria. Centro de Salud Vegadeo. Asturias. ^cMédico de Familia. Área III.

Resumen

Descripción del caso: Mujer 71, acude a urgencias de CS por dolor costal derecho que se irradia a hipocondrio y náuseas. Se pauta analgesia y antieméticos sin obtener mejoría. Se decide derivar a Urgencias donde luego de realizar exámenes complementarios se decide su ingreso.

Exploración y pruebas complementarias: Antecedentes personales Ama de casa y retirada del campo. Casada. 2 hijos. No fumadora. Bebedora moderada de alcohol. HTA. ¿Glucemias límites? No DL. Obesidad mórbida. Asma. Antecedente de amnesia global transitoria. Sd. depresivo. Espondilolistesis II/III L4-L5 con espondilolisis asociada. Intervenciones: Cesárea y ganglion pie derecho, colecistectomía. Constantes a la entrada en urgencias. TA 154/04. FC 72 lpm, saturación 97%, T^a 36,3 °C. General: obesidad, eupneica, bien perfundida e hidratada. Cabeza y cuello: no IY. Tórax: disminución global del murmullo más en bases. AC: regular a 70 lpm, posible soplo sistólico. Abdomen: muy globuloso por panículo adiposo, blando, depresible, no signos de TVP EEII: no edemas, no signos de TVP. Hemograma: Hb 14,1, plaquetas 186.000, leucos 5.730. BQ: glucosa 125, Cr 0,97, Na 145, k 4,1. PCR 5. Perfil hepático normal PCR 5. Orina: leucos +2-5 LXC, escasa celular. Marcadores cardíacos: Tr I 0,05. EC: TTPA 32,5, AP 133%, INR 0,8, fib 316, d-dímero 521. ECG: ritmo sinusal a 66 lpm. Rx tórax: no infiltrados, aumento hilar (derecho) GAB: pH 7,43, p2 67, st 94%, PCo2 44. TAc tórax sin y tras la administración endovenosa de contraste, específicamente dirigido a valorar arterias pulmonares. Se completa el estudio obteniendo imágenes en fase venosa del sector femoropoplíteo bilateral. Dudosos/probable defecto de repleción en arteria segmentaria basal derecha, sin otros hallazgos significativos.

Juicio clínico: Se decide ingreso por probable TEP.

Diagnóstico diferencial: Dolor cólico.

Comentario final: Paciente que no presenta la clínica habitual de TEP que precisa de realizar exámenes complementarios para poder ser diagnosticada.

Bibliografía

- Guía Clínica de tromboembolismo. Fisterra.

Palabras clave: Dolor costal. TEP.