



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/1293 - CUIDADO CON LA URETRITIS

M. Domínguez Mosquera<sup>a</sup>, M. Grande Grande<sup>b</sup>, B. Sainz Arroyo<sup>c</sup>, N. Pérez Sainz<sup>d</sup>, I. Gutiérrez Villa<sup>e</sup> y J. Bringas Fernández<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Pisueña-Selaya. Cantabria. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Bajo Pas. Renedo. Cantabria.

<sup>c</sup>Enfermera. Centro de Salud Pisueña-Selaya. Cantabria. <sup>d</sup>Podólogo. Centro de Salud Cudeyo. Solares. Cantabria. <sup>e</sup>Enfermera. Centro de Salud Cudeyo. Solares. Cantabria. <sup>f</sup>Informático. Bolsa de trabajo SCS. Cantabria.

### Resumen

**Descripción del caso:** Paciente de 24 años acude a urgencias hospitalarias dos meses antes por infección urinaria que tratan con antibiótico de 2 días, se realiza urocultivo posterior a tratamiento y da resultado negativo y demás infecciones de trasmisión sexual también que resultan negativas; posteriormente acude por dolor en testículo derecho, se lo nota hinchado, no ha tenido trauma previo, no presenta fiebre, no tiene síntomas miccionales. Tratamos la infección con doxiciclina y al volver a repetir cultivo de semen antes de ser visto por urología nos da un resultado ya negativo.

**Exploración y pruebas complementarias:** Dolor mejora a la elevación de testículo derecho, aumento de tamaño. Dolor a palpación. Reflejo cremastérico presente. Tira de orina positiva para leucocitos, resto negativo. Ecografía: orquioepididimitis derecha. Cultivo espermático: Staphylococcus coagulasa, Micoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum resultado antibiograma sensible a doxiciclina, cefuroxima, etc.

**Juicio clínico:** El paciente es diagnosticado de orquioepididimitis.

**Diagnóstico diferencial:** Torsión testicular, neo testicular, varicocele, hidrocele.

**Comentario final:** Ureaplasma urealyticum produce una uretritis menos aguda que la gonocócica, que cursa con disuria, polaquiuria y micción imperiosa. Además, puede eliminarse por la uretra un exudado mucoso, transparente o blanquecino, pero no purulento. Persistencias de molestias urinaria y/o gota matutina, con tinción Gram y cultivo negativo a gonococo se atribuye a Clamidia trachomatis o los micoplasmas genitales, por lo cual debe efectuarse un tratamiento con tetraciclinas que, con frecuencia es eficaz.

### Bibliografía

1. Farreras-Rozman Medicina Interna, volumen II, sección 17, Enfermedades infecciosas, parte IV. Enfermedades producidas por Mycoplasma y Chlamydia. García San Miguel J. Enfermedades por Mycoplasma. Barcelona. Doyma.1992;2342-3.
2. Farreras-Rozman Medicina Interna, volumen II, sección 17, Enfermedades infecciosas, parte IX, Problemas especiales en enfermedades infecciosas. Perea EJ. Enfermedades de trasmisión sexual. Barcelona. Doyma.1992;2504-6.

**Palabras clave:** Uretritis. Infección de trasmisión sexual.