



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/2020 - DEL DENTISTA AL DOCTOR

R. Martínez Arribas^a, Á. Puñal Pérez^a, J. Carvajal Alonso-Barajas^b, S. Guerrero Ramírez^c, M. de Leonor Pozurama^d y N. Burlaka Petrasch^e

^a*Médico de Familia. Centro de Salud Bargas. Toledo.* ^b*Médico de Familia. Consultorio Olías del Rey. Toledo.* ^c*Médico de Familia. Centro de Salud Mora. Toledo.* ^d*Médico de Familia. Consultorio de Azucaica. Toledo.* ^e*Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Olías del Rey. Toledo.*

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 34 años, que acude al médico de urgencias por inflamación y dolor en cara derecha y cuello, irradiado hasta región supraclavicular.

Exploración y pruebas complementarias: Lesión en mucosa bucal a nivel de primer molar inferior derecho e inflamación local. A nivel del cuello crepitantes subcutáneos desde el ángulo mandibular derecho, hasta la región supraclavicular derecha sin dolor a la palpación en el momento actual. ACP: normal. Estado general normal. Radiografía cuello: signos de enfisema subcutáneo. Radiografía de tórax: normal.

Juicio clínico: Enfisema subcutáneo en cuello poslimpieza bucal.

Diagnóstico diferencial: Contractura cervical. Dolor molar. Sialoadenitis.

Comentario final: Es importante realizar desde Atención Primaria una buena anamnesis y correcta exploración, para no obviar diferentes diagnósticos, dejándonos influenciar por una primera impresión o diagnóstico más frecuente.

Bibliografía

1. http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=74.
2. Hidalgo, et al. 2014. Enfisema subcutáneo idiopático recurrente. *Medula*. 23:53-8.

Palabras clave: Enfisema. Dolor. Dental.