



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/3035 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS EN UN CENTRO DE SALUD

E. Frutos Hidalgo^a, M. Fábregas Ruano^b y M. Soto Cárdenas^c

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cádiz. ^bMédico Residente de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. ^cFEA de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Resumen

Objetivos: Analizar las características demográficas y comorbilidad de los pacientes con anticoagulación oral en un cupo único de un centro de salud.

Metodología: Estudio observacional descriptivo realizado en un Centro de Salud que atiende a una población de 14.564 habitantes. Se incluyeron de forma consecutiva aquellos pacientes con anticoagulación oral en seguimiento por atención primaria del área sanitaria del centro de salud en cuestión. Se excluyeron aquellos que no realizaron seguimiento adecuado o los datos disponibles eran insuficientes. Se realizó la selección consecutiva de los individuos que cumplían los criterios de inclusión del ámbito de estudio. Se analizarán variables demográficas, enfermedad que motiva la anticoagulación, enfermedades y tratamiento concomitantes y tratamiento anticoagulante.

Resultados: Se incluyeron 96 pacientes con una edad media de 73,8 (\pm 10,7) años, de los que el 56,3% fueron mujeres. El 32,3% tenían algún grado de dependencia y el 2,1% eran grandes dependientes (11,5% con demencia). Casi todos (94,8%) estaban anticoagulados con acenocumarol. Indicaciones: fibrilación auricular (74,0%), embolismo pulmonar (9,4%), ACVA de repetición (7,3%) y otros (9,3%). El 79,2% eran hipertensión y el 41,7% tenía diabetes mellitus. El filtrado glomerular basal (CKD-EPI) fue de 71,8 (\pm 20,7), de los que el 16,5% tenían 50 y el 3,3% 30 ml/min/1,73 m². El tiempo de anticoagulación fue > 6 años en el 59% (6,3%, 1 año). El 18,8% tomaba ácido acetilsalicílico (100 mg) y el 2,1% clopidogrel. Más de la mitad de los pacientes tomaba > 7 fármacos, con una media de 10,3 comprimidos (\pm 5,1).

Conclusiones: Los pacientes anticoagulados presentan un alto grado de comorbilidad y polifarmacia, lo que aumenta el riesgo de interacciones. El riesgo de sangrado también es elevado, por lo que debemos evaluar el beneficio/riesgo de las indicaciones. En nuestro trabajo, la localización más frecuente del sangrado fue el tubo digestivo, precisando la mayoría ingreso hospitalario y transfusión de hemoderivados.

Palabras clave: Anticoagulación. Fibrilación auricular y hemorragia.