



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/3887 - PERO SI ERAN UNOS SIMPLES HONGOS EN LAS UÑAS

E. Pérez Valle^a, M. García García-Alcañiz^a, H. Campos Rodríguez^b, M. Catalán Montero^c, L. Carrillo Carrasco^d y M. del Cerro Saelices^e

^aMédico de Familia. Centro de Salud Las Américas. Parla. Madrid. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Isabel II. Parla. Madrid. ^cMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Américas. Parla. Madrid. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Sector III. Getafe. Madrid. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Ciudades. Getafe. Madrid.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 73 años, hipertenso, dislipémico, EPOC y con antecedente de AIT en 2012 en tratamiento con AAS, que acude a consulta de Atención Primaria por astenia, cefalea tensional, náuseas y sensación de plenitud posprandial de varias semanas de evolución. No asocia fiebre, vómitos ni cambios en el ritmo intestinal. Niega alteraciones visuales ni de la marcha u otra sintomatología de focalidad neurológica, así como tampoco otra clínica en la anamnesis dirigida por aparatos. Niega transgresiones dietéticas. Respecto a su medicación habitual, comenta que inició hace 2 meses tratamiento con terbinafina 250 mg pautado por Dermatología por onicomicosis en primer dedo de pie izquierdo.

Exploración y pruebas complementarias: T^a 36,3 °C, TA 135/85 mmHg, FC 84 lpm, SatO₂ 94% basal, FR 14 rpm. Leve ictericia conjuntival. Auscultación cardíaca normal. AP MV globalmente disminuido de base, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen depresible, leve molestia difusa a la palpación, sin masas ni megalias palpables. MMII sin signos de TVP, pulsos positivos y simétricos. En pie izquierdo onicomicosis en fase de resolución en primer dedo. Exploración neurológica sin datos de focalidad. Analítica con perfil hepático. Nos avisan de laboratorio por Na 126, K 3, GOT 83, GPT 100, GGT 308, bilirrubina 2, bilirrubina directa 0,8, LDH 1,098.

Juicio clínico: Toxicidad por terbinafina.

Diagnóstico diferencial: Hiponatremia: hipotiroidismo, SIADH, i. renal, potomanía. Hipopotasemia: pérdidas gastrointestinales, diuréticos, algunas nefropatías. Hipertransaminasemia: alcohol, hepatitis, hígado graso, toxicidad por fármacos, etc.

Comentario final: En consulta de Atención Primaria es fundamental tener siempre presente que los motivos por los que consultan los pacientes pueden ser debidos a la medicación pautada. En este caso, tras revisar la ficha técnica de la terbinafina, se vio que podía producir los signos y síntomas descritos, por lo que se suspendió el tratamiento. Desde entonces, el paciente mejoró progresivamente y se normalizaron los parámetros analíticos. Esto denota la gran importancia de extremar la precaución con la toma de medicación, sobre todo en mayores de 65 años y realizar vigilancia estrecha.

Bibliografía

1. Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol. 2017;112:18.
2. Adrogué HJ, Madias NE. Hyponatremia. N Engl J Med. 2000;342:1581.

Palabras clave: Onicomicosis. Reacciones adversas relacionadas con medicamentos.