



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/798 - MANEJO DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Sáperas Pérez<sup>a</sup>, A. Vera Morell<sup>a</sup>, C. Sánchez Collado<sup>b</sup> y N. Barlam Torres<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Atención Primaria Plana Lledó. Mollet del Vallès. Barcelona. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Atención Primaria ABS Vall del Ges. Barcelona. <sup>c</sup>Enfermera. Centro de Atención Primaria Sant Fost-Martorelles. Barcelona.

### Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 38 años que acude a consulta a por unos resultados analíticos. Proviene de Mauritania y lleva años aquí. Aprovechamos la visita y abordamos el tema de la mutilación genital (MGF) ya que vemos que no hay registro. Preguntamos por sus orígenes, dónde nació, cómo era la vida en su ciudad de origen y preguntamos si está mutilada. La respuesta es afirmativa por lo que iniciamos el protocolo de MGF. No tiene hijas, solo hijos y el deseo gestacional está cumplido. Explicamos que existe la posibilidad de reconstrucción genital, le damos la información y acepta la derivación. Se deriva a la trabajadora social del centro para coordinar todos los niveles asistenciales y a ginecología siguiendo el circuito de reconstrucción de clítoris.

**Exploración y pruebas complementarias:** Clitoridectomía total.

**Orientación diagnóstica:** MGF tipo I.

**Diagnóstico diferencial:** Tipos de MGF: I. Clitoridectomía; II. Escisión; III. Infibulación; IV. Otros procedimientos.

**Comentario final:** Con los procesos migratorios la mutilación genital femenina (MGF) se ha extendido a otros países, incluido el nuestro, donde sigue siendo un problema olvidado y infradiagnosticado. El protocolo de atención a la MGF incluye una serie de pasos a realizar desde la atención primaria (AP): Valoración, prevención y derivación para reconstrucción. Siempre se tiene que tener en cuenta las posibles hijas y hermanas a riesgo de MGF por lo que se debe de avisar al servicio de pediatría para su correcto manejo.

### Bibliografía

1. Oller I. La Prevenció de la mutilació genital femenina a través del treball comunitari [Internet]. Universitat de Girona; 2012. Disponible en: <http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/7054/La+prevenció+de+la+MGF+a+través+del+treball+comunitari.pdf?sequence=1>
2. Departament d'afers socials. Prevenció de la mutilació genital femenina. [Internet]. [cited 2017 Oct 12]. Disponible en: [http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits\\_tematicos/immigracio/recursos\\_professionals/prevencio\\_mutilaci](http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematicos/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilaci)
3. Calvet S, Canet M, Gracia C, et al. Guia per a l'abordatge del maltractament de gènere a l'atenció primaria. Primera. Institut Català de la Salut; 2003; p. 1-21.

4. Bedoya Muriel M, Bermúdez Anderson K, Goberna Tricas J, et al. Mutilació Genital Femenina: prevenció i atenció [Internet]. Disponible en: <http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/coneixement-assistencial/guies-de-practica-clinica/>

**Palabras clave:** Mujer. Mutilación genital. /Educación para la salud.