




Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



347/1029 - ¿AFECTA LA PRESENCIA DE COMORBILIDADES A LOS DIABÉTICOS TIPO 2 CON DOLOR NEUROPÁTICO DIABÉTICO?

C. Naranjo Muñoz^a, M. Valenzuela Cortés^b, M. Hercberg Moreno^c, L. del Reguero de la Torre^d, P. Ortega Jiménez^e, G. Moratalla Rodríguez^f e I. Failde Martínez^g

^aMédico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Arcos de la Frontera. Cádiz. ^bMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Loreto-Puntales. Cádiz. ^cMédico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Loreto-Puntales. Cádiz. ^dEnfermera. Colaboradora del Observatorio del Dolor. Cádiz. ^eMatemática. Técnico de Apoyo a la Investigación del Observatorio del Dolor. Cádiz. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Loreto-Puntales. Cádiz. ^gCatedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública. Médico Epidemióloga de Observatorio del Dolor. Cádiz.

Resumen

Objetivos: Analizar el efecto de comorbilidades en la presencia de dolor neuropático diabético (DND) en pacientes diabéticos tipo 2 (DM-2).

Metodología: Estudio transversal en una muestra de pacientes con DM-2 de un centro de Atención Primaria. Mediante el Cuestionario Diagnóstico de Dolor Neuropático (DN4), se midió la presencia de DND (≥ 4 puntos en DN4). Se recogió información sobre características sociodemográficas, de tratamiento y clínicas, como presencia de comorbilidades físicas, así como los antecedentes de depresión y/o ansiedad, siendo estas contempladas si tenían registrado en su historia clínica algún trastorno afectivo u otra patología, excluyendo complicaciones y factores de riesgo cardiovascular. Se realizaron análisis descriptivos y bivariantes con paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.21. El estudio se realizó con la aprobación del comité ético de investigación del área de salud y con el consentimiento informado de cada paciente.

Resultados: Se recogió información de 39 sujetos con DM-2, de los cuales el 41% eran mujeres con 71,8 años de media (DT: 11,2). De estos, 46,2% (IC95%: 29,2-63,1) padecían DND, 84,6% (IC95%: 72,0-97,2) alguna comorbilidad física, 35,9% (IC95%: 19,6-52,2) tenían antecedentes de ansiedad y 28,2% (IC95%: 12,8-43,6) tenían antecedentes de depresión. Los factores positivamente asociados a la presencia de DND fueron la presencia de comorbilidad física (95,2% vs 72,2%, $p = 0,041$), tener antecedentes de depresión (42,9% vs 11,1%, $p = 0,028$) y tener antecedentes de ansiedad (57,1% vs 11,1%, $p = 0,003$).

Conclusiones: Los diabéticos con DND parecen tener más comorbilidad física y más antecedentes de trastornos afectivos (ansiedad y/o depresión) en comparación a los diabéticos que no padecen DND.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2. Dolor neuropático diabético periférico. Comorbilidad.