



## Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

### 347/242 - SINTROM: DOCTOR, ESTOY CANSADO DE TANTOS CONTROLES

I. Reyes Ruíz<sup>a</sup>, E. Delgado Pérez<sup>b</sup>, M. Gallego Cabrera<sup>c</sup>, P. Coco Alonso<sup>c</sup>, A. Fernández Rosa<sup>b</sup> y L. Reyes Gómez<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico General. Centro de Salud Madre de Dios. Jerez. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Madre de Dios. Jerez. <sup>c</sup>Médico General. Centro de Salud San Benito. <sup>d</sup>Enfermera. Centro de Salud Madre de Dios. Jerez.

### Resumen

**Objetivos:** Analizar el uso de fármacos anticoagulantes, patologías que ocasionan su tratamiento y rango terapéutico tras su uso en el Centro de Salud de Madre de Dios.

**Metodología:** Estudio observacional, descriptivo transversal respecto a los datos obtenidos a través del programa diseñado a tal fin por el servicio de hematología del hospital de Jerez y utilizados por facultativos del Centro de Salud de Madre de Dios durante el año 2016.

**Resultados:** Atendemos un total de 279 pacientes con fármacos anticoagulantes (sintrom). La distribución por sexo ofrece un 58% de mujeres y un 42% de hombres. Por edades (49% > 81 años, 46% entre 51 y 81 años y un 5% de 50 años. El 67% de la patología se debe a FA, 8% trombosis venosa y 6% patología valvular como 3º causa, la menos prevalente arteriopatía periférica 3%. Mujer > 80 años con FA. El 7% de los pacientes actualmente en tratamiento con sintrom no cumplen criterios de calidad (se encuentran fuera de rango más de la mitad de las veces que realizamos control).

**Conclusiones:** Predominio de mujeres en edades avanzadas. Cumplimiento de rango terapéutico e indicadores de calidad en la mayoría de los pacientes. Fibrilación auricular como patología más prevalente. Un 7% de los pacientes no cumple objetivo terapéutico y serían susceptibles de indicación a NAOs.

**Palabras clave:** Controles. Rango. Anticoagulantes.