

347/3170 - CONTROL POR MATRONA, MOLESTIAS VAGINALES: ÚLCERA VAGINAL POR PANTOEA SÉPTICA

J. Jurado Palacios^a, I. Manzanares Mir^b y N. Armas Sánchez^c

^aMédico de Familia. Centro de Salud Rafal Nou. Illes Balears. ^bMatrona. Centro de Salud Rafal Nou. Palma. Illes Balears. ^cMédico de Familia. Centro de Salud de Son Cladera. Illes Balears.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 32 años sin antecedentes de interés, que es valorada por matrona por lesión a nivel de labio mayor izquierdo de \pm 3 semanas de evolución. Refiere lesiones recurrentes (2 ocasiones previas) en labio mayor derecho. Niega viajes a países tropicales. Viaja hace \pm 1 año en Berlín. Parto hace 2 meses. Pareja estable desde febrero/2017. Matrona recoge muestras para cultivos y pauta tratamiento con fluomizin. Luego de 1 semana acude a recoger resultados.

Exploración y pruebas complementarias: Lesión ulcerativa en labio mayor derecho. Cultivo vaginal: 03/07/2018. Cultivo exudado vaginal: Gardnerella vaginalis. Cultivo de lesión en labio mayor: 03/07/2018: Pantoea septica. Luego de tratamiento acude a control. Examen físico: no presenta lesiones vaginales. Mejoría de úlcera en labio mayor izquierdo. Aspecto normal.

Orientación diagnóstica: Úlcera vaginal por Pantoea septica. Vaginitis por Gardenella.

Diagnóstico diferencial: Herpes genital. Sífilis. Chancroide o chancro blando. Linfogranuloma venéreo (LGV). Granuloma inguinal o donovanosis. VIH.

Comentario final: Paciente con úlceras vaginales recurrentes, a la que se le recoge muestra de la lesión, y se pauta tratamiento con fluomizin 10 mg 6 comprimidos vaginales. Luego de 1 mes no ha presentado recidivas.

Bibliografía

1. Cheikh Ibrahima L, Roshan P, Oleg M, et al. Genome sequence and description of *Pantoea septica* strain FF5. *Standards in Genomic Sciences*. 2015;10:103.
2. Brady CL, Cleenwerck I, Venter SN, et al. Emended description of the genus *Pantoea*, description of four species from human clinical samples, *Pantoea septica* sp. nov., *Pantoea eucrina* sp. nov., *Pantoea brenneri* sp. nov. and *Pantoea conspicua* sp. nov., and transfer of *Pectobacterium cypripedii* (Hori 1911) Brenner et al. 1973 emend. Hauben et al. 1998 to the genus as *Pantoea cypripedii* comb. nov. *Int J Syst Evol Microbiol*. 2010;60:2430-40.

Palabras clave: *Pantoea septica*. Fluomizin.