



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/4173 - CONTROL DEL TABAQUISMO EN 2018 EN OSI ARABA

G. Mediavilla Tris^a, J. Iturralde Iriso^b, A. Delgado Yáñez^c, N. García de Garayo^d, M. Arrazola Vallejo^e, R. Sendino del Olmo^f, E. Zorrilla Amirola^g, A. Cruz Núñez^h, A. Payueta Zarate^g y M. Pinel Monge^b

^aMédico de Familia. Centro de Salud Aranbizarra I. Vitoria-Gasteiz. ^bMédico de Familia. Centro de Salud La Habana-Cuba. Álava.

^cMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Habana-Cuba. Vitoria-Gazteiz. ^dMédico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. OSi Araba. Vitoria-Gasteiz. ^eMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Martín. Álava. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Aranbizarra I. Álava. ^gMédico Residente de 1º año de Medicina Familiar y Comunitaria. OSi Araba. Vitoria-Gasteiz. ^hMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. OSi Araba. Vitoria-Gasteiz.

Resumen

Objetivos: El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. El tabaquismo en nuestro país es, en la actualidad, la primera causa aislada de enfermedad evitable, invalidez y muerte prematura. Cada año, más de 50.000 personas mueren prematuramente en España debido al consumo de tabaco. La mitad de las personas que mueren debido al tabaquismo han perdido una media de 20 años de vida. Y muchas más personas y familiares ven seriamente disminuida la calidad de los años vividos. El objeto del estudio es conocer el grado de control que en AP tenemos del tabaquismo en la OSi Araba.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, transversal realizado sobre la población de OSi Araba (308.196 hab.) en abril 2018, según los resultados de la Oferta Preferente de Osakidetza. Cribado: debe realizarse a todas las personas > 14 años, al menos cada dos años. Consejo y oferta: a todo paciente fumador se le dará consejo para el abandono del tabaquismo como mínimo cada dos años.

Resultados: Población diana: 266.196 personas. Cribado: nº cumplidos: 80,20%. Prevalencia: 20,05%. Consejo/oferta: 44,67%. Exfumadores: 12,42%.

Conclusiones: Observamos un alto porcentaje de cribado, siendo menor el del consejo, por lo que ya identificamos un área de mejora. Sabemos que el objetivo marcado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo integrado por 32 sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito sanitario (CNPT) es el de lograr que en 2040 la proporción de fumadores no supere el 5%, vemos que aún estamos lejos (20,05%).

Palabras clave: Tabaco. Atención Primaria.