



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

424/2302 - ANEMIA CRÓNICA Y ANTICOAGULACIÓN ORAL

R. Hidalgo Navarro¹, M. Guerrero Cruces¹, H. Cruz Terrón¹ y C. Aguado Taberne²

¹Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Rosa. Córdoba. ²Tutora Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Rosa. Córdoba.

Resumen

Descripción del caso: Paciente de 64 años con AP de HTA, DM, dislipemia y fibrilación auricular permanente en tratamiento con acenocumarol. Acude a urgencias por astenia intensa desde hace 2 meses con anorexia y pérdida de unos 4 kg. En analítica realizada en urgencias presenta anemia microcítica, ya conocida desde hace años, en tratamiento con hierro y transfusiones periódicas desde hace 5 años, realizado estudio con EDA y colonoscopia normal. En el último mes ha requerido transfusión de 5 concentrados de hematíes.

Exploración y pruebas complementarias: Buen estado general. Consciente y orientada. Palidez mucocutánea. TA 120/80 mmHg. FC 70 lpm. ACR: arrítmica, no se ausulta soplos. MVC. Analítica: hemoglobina 7,9 g/dl, hematocrito 26,1%, VCM 74,5 fL, INR 2,6, TP Act 26% ECG: arrítmica, PR y QRS normal. Sin alteraciones en el intervalo ST. EDA: Gastropatía leve de la HTTP. TAC, TAP: Divertículos en colon descendente y sigma. Colonoscopia: hemorroides. Divertículos colónicos. Colitis peridiverticular. Angiodisplasia colónica.

Orientación diagnóstica: Anemia en rango transfusional por anticoagulantes orales.

Diagnóstico diferencial: Anemia por procesos crónicos. Anemia ferropénica.

Comentario final: Los eventos hemorrágicos digestivos fueron más frecuentes en pacientes tratados con warfarina, por lo que en estos pacientes se puede considerar tratamiento sustitutivo con los nuevos anticoagulantes.

Bibliografía

- Westenbrink BD, Alings M, Granger CB, et al. Anemia is associated with bleeding and mortality, but not stroke, in patients with atrial fibrillation: Insights from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) trial. Am Heart J. 2017;185:140-9.
- Sherwood MW, Nessel CC, Hellkamp AS, et al. Gastrointestinal Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation Treated With Rivaroxaban or Warfarin: ROCKET AF Trial. J Am Coll Cardiol. 2015;66(21):2271-81.

Palabras clave: Warfarina. Anemia crónica.