

424/1785 - ASOCIACIÓN ENTRE ENDOMETRIOSIS Y DISFUCIÓN SEXUAL FEMENINA

E. Aranda Serna¹, M. Sánchez Ferrer², J. Mendiola Olivares³ y C. Gil Gómez¹

¹Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Espinardo. Murcia. ²Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. ³Profesor Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia.

Resumen

Introducción: La endometriosis afecta a un 6-10% de mujeres en edad reproductiva que comúnmente se manifiesta con dolor pélvico e infertilidad y que tiene una influencia social y psicológica importante sobre mujeres jóvenes y sexualmente activas.

Objetivos: Evaluar la función sexual en mujeres con endometriosis comparándola con mujeres sanas.

Diseño: Estudio caso-control.

Emplazamiento: Departamento de Obstetricia y Ginecología de un hospital de nivel terciario.

Material y métodos: Se utilizó el cuestionario de autoevaluación del Índice de la Función Sexual Femenina (FSFI). Población diana: pacientes de sexo femenino con intervalo de edad entre 18 y 50 y activas sexualmente. Tamaño muestral: grupo de casos (n = 71) mujeres con endometriosis tanto prevalentes como diagnosticados nuevamente. Grupo control (n = 135) se compone de mujeres sin endometriosis. Variables: deseo, excitación, lubricación vaginal, orgasmo, satisfacción y dolor. Métodos estadísticos: las variables se compararon utilizando la prueba U de Mann-Whitney desapareada (o de muestras independientes). Se consideraron significativos los valores de p < 0,05. Los análisis estadísticos se realizaron usando el programa IBM SPSS 20.0.

Aplicabilidad: Valoración y abordaje de la función sexual de la mujer con endometriosis para mejorar su salud psicológica y social.

Aspectos ético-legales: Éste estudio tuvo la certificación de conformidad del Comité de Ética Hospitalario.

Palabras clave: Endometriosis. Función sexual.