

<http://www.elsevier.es/semergen>

424/1570 - PICADURA DE MEDUSA: CUANDO LA BELLEZA MOLESTA

C. Montoya Belmonte¹, A. Bárzano Cruz², M. Sánchez Fernández³ y L. Re Moreno⁴

¹Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santo Ángel. Murcia. ²Médico de Familia. Centro de Salud de la Alberca. Murcia. ³Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud la Ñora. Murcia. ⁴Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Palmar. Murcia.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 41 años de edad que acude a nuestro centro de salud por picadura de medusa dos días antes. Refiere que mientras se encontraba buceando notó un latigazo intenso en la muñeca derecha seguido de quemazón intensa y prurito. Su mujer (enfermera) retira los tentáculos con pinzas y administra Urbason sin mejoría, a medida que pasa el fin de semana no mejora la sensación urente y comienza prurito intenso, edema, eritema, aumento de la temperatura y ampollas en región medial de cuello derecho, por lo que decide acudir al centro de salud en busca de ayuda. No refiere dificultad respiratoria ni sensación distémica. AP: rinoconjuntivitis y asma bronquial alérgico.

Exploración y pruebas complementarias: CyO. BEG. T^a: 36,6 °C. TA: 101/55 mmHg. FC: 65 lpm. AC: Rítmico sin soplos. AP: MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalías. Peristaltismo normal. Sin signos de irritación peritoneal. MMII: no edemas ni signos de TVP con pulsos conservados. Exploración neurológica: sin focalidad neurológica. Cutáneo: aumento de temperatura, edema en dorso de mano derecha, eritema hasta 1/3 inferior de miembro superior derecho, 7 ampollas de pequeño diámetro en articulación carpiana derecha con supuración leve. No impotencia funcional. Tras una valoración completa se inicio tratamiento con amoxicilina-clavulánico de forma empírica, corticoides sistémicos y antihistamínicos.

Orientación diagnóstica: Debido a la historia clínica y ante las lesiones descritas debemos de pensar en una picadura de medusa y en sus posibles complicaciones.

Diagnóstico diferencial: Picadura. Celulitis. Urticaria. Trombosis.

Comentario final: Muchos profesionales trabajamos en zonas de costa, por lo que debemos de estar preparados para saber tratar y actuar ante picaduras de medusas. Es muy importante saber las medidas generales: Retirar los tentáculos visibles con unas pinzas finas y sumergir la zona en agua caliente (43 a 45 °C) durante 20-45 minutos. Posteriormente tratamiento sintomático.

Bibliografía

- Mayo Foundation for Medical Education and Research. Picaduras de medusa: Diagnóstico y tratamiento. [Internet]. Rochester: Mayoclinic.org, 2019 [citado 10 Julio 2019]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/jellyfish-stings/diagnosis-treatment/drc-20353290>

2. MurciaSalud. Como tratar las picaduras de medusa, teniendo en cuenta las especies existentes en la Región de Murcia. [Internet]. Murcia: Murciasalud.es, 2019. [citado 23 Jul. 2019]. Disponible en: <https://www.murciasalud.es/preevid/18733>

Palabras clave: Picadura. Medusa. Celulitis.