

424/171 - PAPI, ME DUELE LA BARRIGA

R. Muñoz Martos¹, P. Hermoso Oballe¹ y D. Rodríguez Rodríguez²

¹Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Comarcal de la Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga.²Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vélez-Málaga Norte. Axarquía. Málaga.

Resumen

Descripción del caso: Motivo de consulta: dolor abdominal. Antecedentes personales: NAMC. Vacunada correctamente incluyendo vacunas privadas. No enfermedades actuales. No intervenciones quirúrgicas. No tratamiento actual. Natural de China. Enfermedad actual: niña de 10 años que acude por dolor abdominal desde el día de ayer. Dolor tipo cólico. Lo localiza a nivel de flanco derecho. No se irradia y le ha despertado durmiendo. No ha tenido fiebre ni náuseas ni vómitos. Ayer tuvo una deposición normal. No disuria, dudosa polaquiuria, no tenesmo vesical. Orina normal. Hiporexia. Acudió a nuestro servicio por misma sintomatología hace unos días, diagnosticada de estreñimiento.

Exploración y pruebas complementarias: Peso: 44 kg. TA 109/57 mmHg, FC: 111 lpm, SatO2 98%, T^a 36,5 °C. BEG. BHYP. COC. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneica en reposo. Afebril. CYC: no adenopatías palpables. No signos meníngeos. AC: Rítmico, taquicardia, no soplos audibles. AP: Buena ventilación bilateral. MVC, no ruidos patológicos. Abdomen: blando, depresible a la palpación, no distendido, doloroso a la palpación en HCD, flanco derecho y FID. Predominio en HCD con defensa abdominal voluntaria, Murphy +, dudosa hepatomegalia. Blumberg -, Psoas -, Mcburney -, Punta-talón -. No hernias. No timpanismo. RHA +. PPRR bilateral negativa. Combur test: negativo. AS: leucocitos 25.600, neutrofilos 20.800, linfocitos 2.350, Nt 81,20%, Lt 9,20%. Hb 13 g/dl, Plaquetas 439.000. Coagulación normal. Bioquímica con perfil hepático normal. PCR: 147,7. Ecografía de abdomen: hallazgos sugestivos de apendicitis aguda retrocecal evolucionada/complicada con colección/absceso asociado. Pequeña lengüeta de líquido perirrenal inferior.

Orientación diagnóstica: Apendicitis retrocecal aguda complicada.

Diagnóstico diferencial: Cólico renoureteral derecho, cólico biliar.

Comentario final: El apéndice vermiforme se encuentra en la base del ciego, cerca de la válvula ileocecal donde la Taenia coli converge en el ciego. La punta del apéndice puede migrar a las posiciones retrocecal, subcecal, preileal, postileal y pélvica. Estas variaciones anatómicas normales pueden complicar el diagnóstico, ya que el sitio del dolor y los hallazgos en el examen clínico reflejarán la posición anatómica del apéndice.

Bibliografía

1. Martin R. Acute appendicitis in adults: Clinical manifestations and differential diagnosis [Internet]. Uptodate. [Consultado 26 mayo 2019]. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/acute->

Palabras clave: Dolor abdominal agudo. Apendicitis. Dolor flanco derecho.