




# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 424/3732 - EDAD, SEXO Y RAZA DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR INCLUIDOS EN EL ESTUDIO IBERICAN

P. Morán Oliva<sup>1</sup>, J. Polo García<sup>2</sup>, M. Turégano Yedro<sup>2</sup>, N. Aguilar Gómez<sup>3</sup>, B. López Uriarte<sup>4</sup>, A. Rodríguez Pérez<sup>5</sup>, E. Alarcón Cebrián<sup>6</sup>, R. Latorre Santos<sup>7</sup>, M. Babiano Fernández<sup>8</sup> y S. de Abajo Olea<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mendiguchía Carriche. Madrid. <sup>2</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Aldea Moret. Cáceres. <sup>3</sup>Centro de Salud Torreblanca. Castellón. <sup>4</sup>Centro de Salud Humanes de Madrid. Madrid. <sup>5</sup>Centro de Salud Ordenas. A Coruña. <sup>6</sup>Centro de Salud Montesa. Madrid. <sup>7</sup>Centro de Salud Peñíscola. Castellón. <sup>8</sup>Centro de Salud Argamasilla de Calatrava. Ciudad Real. <sup>9</sup>Centro de Salud San Andrés de Rabanedo. León.

### Resumen

**Objetivos:** Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así como de los eventos cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue analizar la edad, el sexo y la raza de los pacientes con fibrilación auricular (FA) incluidos en el estudio IBERICAN.

**Metodología:** IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional y multicéntrico en el que se incluyeron pacientes de 18 a 85 años atendidos en las consultas de Atención Primaria en España. El tamaño muestral fue de 8.066 pacientes, alcanzando el tamaño muestral objetivo, que serán seguidos durante al menos 5 años. Se analizaron las características demográficas (edad, sexo y raza) de los pacientes con fibrilación auricular (FA).

**Resultados:** El corte analizado (n = 8.066) presentó una prevalencia de FA del 5,79% (n = 467). La distribución por sexo: 56,5% (264) varones y 43,5% (203) mujeres. La prevalencia de FA fue en varones respecto a la de mujeres (7,20% vs 4,61%; p 0,001). La edad media en los pacientes con FA fue de 70,07 ± 11,57 vs 57,12 ± 14,68 años en los pacientes sin FA. La distribución en porcentajes de edad de los pacientes con FA en 6 rangos etarios fue: 2,4% en menores de 40 años, 3,6% de 40 a 49 años, 10,1% de 50 a 59 años, 21,4% de 60 a 69 años, 40,0% de 70 a 79 años y 22,5% en aquellos con edad igual o mayor a 80 años. La mayoría de los pacientes incluidos fueron de raza blanca (98,9%; p = 0,003), siendo las razas negra y asiática las siguientes más prevalentes (0,4% p = 0,003).

**Conclusiones:** Los resultados de nuestro estudio muestran que los pacientes con FA incluidos son de mayor edad que los pacientes sin FA, siendo el intervalo de 70 y 79 años la franja de edad más prevalente para FA, con raza caucásica en su mayoría. Aparece con mayor frecuencia en varones respecto a mujeres, datos que son concordantes a los observados en otros estudios realizados en España.

**Palabras clave:** Fibrilación auricular. Estudio IBERICAN.