



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

482/5 - ¿ES UN OSTEOSARCOMA?

M. Pejenaute Labari¹, A. Segura Grau², A. Moran Escudero³ y Á. Sáez Fernández¹

¹Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid.²Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital de la V.O.T. de San Francisco de Asís. Madrid.³Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Juncal. Torrejón de Ardoz. Madrid.

Resumen

Descripción del caso: Paciente de 67 años, con antecedentes de osteoporosis en tratamiento con vitamina D y denosumab semestral. Acudió a consulta por coxalgia izquierda mecánica de 5 meses de evolución, sobre todo al sentarse y acostarse sobre ese lado, sin otra clínica acompañante. A la exploración física presentaba dolor selectivo, unilateral a la presión en trocánter mayor y a la abducción y rotación externa. La paciente había seguido tratamiento con AINE, paracetamol, metamizol y tramadol sin mejoría.

Exploración y pruebas complementarias: Con la sospecha clínica de trocanteritis, se le solicitó una radiografía de cadera y fémur por el tiempo de evolución y la falta de respuesta al tratamiento, en la que se objetiva signos degenerativos en articulación coxofemoral, signos de entesopatía crónica en trocánter mayor y en el ilíaco izquierdo una imagen esclerosa de bordes espiculados de 36 × 20 mm.

Orientación diagnóstica: Ante este hallazgo contactamos con radiología que le hace una RMN que fue informada como lesión en ilíaco geográfica bilobulada de 31 mm, sugerente de enostosis ósea gigante y tendinopatía insercional del glúteo medio. Se citó a la paciente para explicarle la benignidad de su lesión, que no requiere tratamiento y se la derivó a traumatología que la citó en 6 meses para seguimiento. La paciente actualmente está asintomática tras serle realizada una infiltración en trocánter.

Diagnóstico diferencial: Osteosarcoma esclerosante intramedular, metástasis osteoblásticas, osteoma osteoide y encondroma.

Comentario final: Las enostosis o islotes óseos son neoformaciones óseas, benignas, frecuentes en hueso esponjoso de cuerpos vertebrales, pelvis, costillas o las metáfisis de los huesos largos. Radiológicamente son lesiones escleróticas, generalmente únicas, ovales de 2 a 20 mm cuyos márgenes presentan espículas radiantes que se mezclan con las trabéculas vecinas. Son de etiología desconocida, asintomáticas y suelen aparecer como un hallazgo accidental. El diagnóstico se realiza mediante RMN/TAC (las mediciones de atenuación de la TAC pueden ayudar en la distinción). No requieren tratamiento específico.

Bibliografía

1. Yu M, Hoffe S. Epidemiología, presentación clínica y diagnóstico de metástasis ósea en adultos (internet). USA: UpToDate; c2019 [actualizado 25-7-2019; citado 8-5-2020]. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinical-presentation-and-diagnosis-of-bone-metastasis-in-adults>

Palabras clave: Enostosis.