



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 482/652 - RELACIÓN ENTRE LA PIROSIS RETROESTERNAL Y LA TOMA DE ANSIOLÍTICOS EN UN CENTRO DE SALUD RURAL

L. García Andrés<sup>1</sup>, F. Álvarez-Franco Cañas<sup>2</sup>, J. Fernández Villar<sup>3</sup>, M. Arrimada García<sup>4</sup>, S. Fernández Diez<sup>5</sup>, S. Anselmi González<sup>6</sup>, M. Ajenjo González<sup>7</sup>, L. González Vázquez<sup>8</sup>, N. Cubelos Fernández<sup>9</sup> e I. Gomáriz Pérez<sup>10</sup>

<sup>1</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Andrés del Rabanedo. San Andrés del Rabanedo. León.<sup>2</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Bañeza I. La Bañeza. León.<sup>3</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Santa María de Ordás. Santa María de Ordás. León.<sup>4</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Astorga. León.<sup>5</sup>Enfermera. Complejo Asistencial Universitario de León. León.<sup>6</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Aguado-León V. León.<sup>7</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Boñar. Boñar. León.<sup>8</sup>Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Las Palmas de Gran Canaria.<sup>9</sup>Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Aguado-León V. León.<sup>10</sup>Especialista en Médico de Familia. Consultorio del Llano. Centro de Salud Profesor Jesús Marín. Molina de Segura. Murcia.

### Resumen

**Objetivos:** Relacionar pirosis retroesternal con tomas de ansiolíticos, analizando sus características en función de sexo y edad en una zona rural.

**Métodos:** Estudio descriptivo observacional con método estadístico aleatorio simple con una muestra al azar con captación de uno de cada dos pacientes en consulta médica habitual en un centro de salud rural. Recogida de la muestra total de 250 pacientes durante 1 mes con criterios de inclusión (con registro en historia clínica): 1) Edad 18 a 85 años, 2) Pertenencia al Centro de Salud, 3) Tener clínica de pirosis y 4) Consumo de ansiolíticos. Distribución por sexos en grupos de 5 en 5 años.

**Resultados:** Muestra total de 250 pacientes (135 mujeres y 115 varones). 135 mujeres = 53 (39,25%) con pirosis + 76 (56,20%) con toma de ansiolíticos + 48 (36,50%) con pirosis con toma de ansiolíticos. 115 varones = 49 (42,60%) con pirosis + 40 (34,78%) con toma de ansiolíticos + 34 (29,56%) con pirosis con toma de ansiolíticos. 65% pirosis con toma de ansiolíticos = entre 50 y 65 años.

**Conclusiones:** Prevalencias: pirosis (40%) y pirosis con toma de ansiolíticos (30% y más en mujeres). Pirosis con toma de ansiolíticos mayor entre 50 a 65 años.

**Palabras clave:** Pirosis. Ansiolíticos. Rural.