




Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



333/60 - NEURALGIA DEL TRIGÉMINO: UNA PATOLOGÍA NO TAN INFRECUENTE

R. Martín Jiménez¹, M. Turégano Yedro², E. Jiménez Baena³, R. Sánchez Rodríguez⁴, A. Martín Morcuende⁵, L. Fernández Salinas⁶.

¹Médico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Manuel Encinas. Cáceres.

²Médico Residente de 4^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Jorge. Cáceres. ³Médico Residente de 4^o año de Cardiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. ⁴Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitario. Centro de Salud Pola de Siero. Asturias. ⁵Médico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona Centro. Cáceres. ⁶Médico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almassora. Castellón.

Resumen

Objetivos: Evaluar el conocimiento de médicos de atención primaria sobre la neuralgia del trigémino: experiencia, conocimiento, tratamiento aplicado y manejo en atención primaria.

Metodología: Estudio basado en encuesta epidemiológica realizada a 26 médicos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria y con ejercicio actual en consultas de atención primaria. En dicha encuesta se recogieron datos sobre la neuralgia del trigémino: casos vistos en su trayectoria profesional, si conocían el tratamiento de elección, si lo habían empleado, y si su manejo fue en atención primaria o no.

Resultados: Se realizó encuesta a 26 médicos de familia con al menos 5 años de ejercicio profesional en consultas de atención primaria. El 92,3% había visto casos de neuralgia del trigémino y tan solo el 7,7% no había tenido casos. Respecto al número de casos los porcentajes fueron: 0 (7,7%), 1 (23,1%), de 2 a 5 (42,3%), de 5 a 10 (15,4%) y más de 10 (11,5%). El 80,8% sabían que el tratamiento de elección era la carbamazepina. Sin embargo, el principal fármaco empleado fue la carbamazepina en el 19,2% casos, otros fármacos con acción neuropática en el 42,3% y analgésicos tradicionales en el 38,5% restante. Por último, el manejo se realizó principalmente en atención primaria con un 76,9% casos frente al 23,1% restante, cuyo uso fue hospitalario.

Conclusiones: La neuralgia del trigémino no es una patología tan infrecuente en las consultas de atención primaria. Su manejo suele llevarse a cabo principalmente en las consultas de atención primaria; y su terapéutica es controvertida, ya que pese a que la mayoría de facultativos conocen su tratamiento de elección no lo suelen emplear en su práctica clínica habitual.

Palabras clave: Neuralgia, trigémino, tratamiento.