



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## P-293 - ANTIDEPRESIVOS Y BENZODIACEPINAS EN EL ANCIANO

H. Rosúa Urbano, C. Chacón Romera y M.J. Castro Serrano

CS Miraflores de los Ángeles.

### Resumen

**Objetivos:** Relacionar el consumo de benzodiacepinas (BZD) con antidepresivos (ATD). Observar si existen diferencias entre los grupos de antidepresivos. Determinar la polimedición en el grupo de estudio. Diseño: observacional, descriptivo y transversal. Emplazamiento: Atención primaria, dos centros de salud urbanos.

**Metodología:** 8.916 habitantes a partir de los cuales se obtiene un tamaño muestral de 320. El criterio de inclusión fue ser mayor de 65 años y de exclusión ausencia de datos en las historias clínicas. Se realizó una aleatorización simple para la selección de pacientes. Las variables observadas fueron consumo BZD (Sí/No), consumo ATD (Sí/No), polimedición (3 fármacos, Sí/No). Mediante la chi cuadrado se relacionó el consumo de BZD con ATD y también BZD con polimedición.

**Resultados:** El consumo de BZD fue de 43,8%, frente al 18,8% de ATD. Apenas existen diferencias entre varios antidepresivos (sertralina, fluoxetina, citalopram, otros, con un 25% en cada uno de ellos) La polimedición supuso un 76,6% dentro de la cual en un 51,8% se encontraba una BZD con una  $p = 0,001$ . Relacionando consumo de BZD y ATD tuvimos un 60% pero con una  $p = 0,006$ .

**Conclusiones:** La polimedición es un problema sanitario difícil de controlar pero debemos de usar todas las medidas disponibles para atajarla. Necesitaríamos una muestra mayor observar la fuerza de asociación entre BZD y ATD. No existen diferencias entre los diferentes grupos de antidepresivos.