



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

262/228 - FIEBRE Q, A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Rodríguez Rodríguez^a, M. Villarejo Botija^b, L. Gómez-Sánchez^c, L. Martín Fuertes^b, M. Ricote Belinchón^d y G. Rojas Martelo^e

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Madrid. ^bMédico Residente. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Monovar. Madrid. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. ^eMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid.

Resumen

Descripción del caso: Varón 34 años con antecedentes personales de migraña, acude por dolor abdominal difuso con vómitos biliosos postprandiales y diarreas sin productos patológicos de 2 días de evolución. Refiere cefalea y fiebre de 38 °C. A la exploración abdomen blando y depresible, con molestias a la palpación difusa sin signos de irritación peritoneal ni datos de focalidad neurológica. Se diagnostica de gastroenteritis aguda y se pauta tratamiento sintomático. Acude nuevamente por persistencia de cefalea y mal estado general. Refiere dos picos febriles de 38 °C. Orina colúrica. No ingesta de alimentos en mal estado ni viajes recientes. Tiene dos perros. REG. Afebril. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación de hipocondrio derecho y epigastrio con dudoso Murphy positivo. Neurológicamente sin focalidad. Ante la sospecha de colecistitis aguda se deriva a urgencias.

Exploración y pruebas complementarias: Analítica con transaminasas × 5, FA 216, GGT 130, sin hiperbilirrubinemia, PCR 182 y trombopenia. Ecografía abdominal sin hallazgos. Rx tórax normal. Valorado por infecciosas pautan ceftriaxona y cursan ingreso con diagnóstico de cuadro de vómitos y diarrea a filiar y alteración del perfil hepático. se añade doxiciclina oral. Se solicita coprocultivo y serologías para virus hepatotropos e VIH negativas. Serología Coxiella brunetti IgM e IgG positiva. Tras 48 horas de tratamiento el paciente queda afebril, sin vómitos ni diarreas.

Juicio clínico: Fiebre Q.

Diagnóstico diferencial: Gripe, hepatitis vírica, enfermedad de Lyme, fiebre recurrente, fiebre manchada de las montañas rocosas, brucelosis, leptospirosis, neumonía.

Comentario final: La fiebre Q es una zoonosis producida por Coxiella burnetii. Los reservorios más frecuentes son los animales de granjas (vacas, cabras y ovejas). Se excreta en la orina, heces y leche de animales infectados. La vía principal de transmisión es la inhalación de aerosoles contaminados. La fiebre Q aguda es con frecuencia asintomática. Tras incubación de unos 20 días, puede presentarse como un síndrome febril, una neumopatía intersticial o una hepatitis. La forma crónica se desarrolla en los meses o años siguientes a la forma aguda. La endocarditis es la forma más frecuente. El diagnóstico se basa en la serología. La forma aguda responde bien al tratamiento con tetraciclinas u otros antibióticos.

Bibliografía

1. Raoult D. Clinical manifestations and diagnosis of Q fever. *Uptodate*, 2016.