



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

441/4 - DESPRESCRIPCIÓN DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES EN ATENCIÓN PRIMARIA - REVISIÓN SISTEMÁTICA

I. Luna Calcaño¹, A. Sierra Aquino², I. Sánchez López¹, M. Leal Lobato¹

¹Centro de Salud Lorca San Diego. Murcia. ²Centro de Salud Totana. Murcia.

Resumen

Objetivos: 1. Aportar una fuente de conocimiento sobre protocolos o algoritmos de desprescripción de inhibidores de la bomba de protones (IBPs) en población adulta en Atención Primaria. 2. Seleccionar el algoritmo o protocolo o guía clínica de desprescripción que cumpla con la mayoría de los criterios propuestos por AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) para ser recomendado como protocolo de desprescripción de IBP en población adulta.

Metodología: De acuerdo a diversas investigaciones está claro que existe una necesidad de desprescribir IBP en población adulta que no tiene una indicación apropiada. Lo que no parece claro es la forma que deberíamos seguir para dicha desprescripción, o mejor dicho el cómo hacerlo. En esta revisión sistemática nos proponemos conocer todos los algoritmos que se reflejan en la literatura científica sobre el tema y proponer para consideración de uso en AP, aquel algoritmo con mayor puntuación de acuerdo a los criterios de elegibilidad, calidad y aplicabilidad para guías clínicas AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation). Se ha realizado una revisión sistemática de la Literatura Científica en PubMed bajo la metodología PRISMA. Se han encontrado 43 estudios, bajo términos MESH. Se han seleccionado 4 estudios que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Como prueba de concordancia entre revisores, se escogió el Índice de Kappa. La revisión se efectuó en pares. Se evalúo de los trabajos la guía clínica de desprescripción de IBP's que aportaban con el cuestionario para estos propósitos denominado AGREE por sus siglas en inglés.

Resultados: Índice de Kappa: 0,7. Indica adecuada concordancia entre revisores en la selección de los artículos encontrados. La Guía clínica con mayor puntuación en cuestionario AGREE fue la Canadiense: Deprescribing Proton Pump Inhibitors. Farrell et al. 2017, con una puntuación total en porcentaje de 114%.

Conclusiones: La guía canadiense de desprescripción de IBPs se propone como una posibilidad para ejecutar el cómo desprescribir estos fármacos en atención primaria, obteniendo la más alta puntuación en el cuestionario de calidad AGREE.

Palabras clave: Desprescripción. Crónicos. IBP.